BUPRESTIDES NOUVEAUX DE L'AUSTRALIE ET DES RÉGIONS VOISINES

par Ch. Kerremans.

Iridotænia auripennis nov. sp. — *Naviculaire, allongé, atténué à l'extrémité; tête et pronotum d'un vert bleuâtre brillant, les côtés du dernier ornés d'une tache dorée et finement granuleuse; écusson bleu; élytres d'un vert doré brillant à reflets cuivreux éclatants. Dessous d'un vert bleuâtre doré et brillant.* — Long., 25-32; larg., 7,5-10 mill.

Nias (Staudinger).

Espèce voisine des *I. purpureipennis* Waterh., des îles Andaman, et *scutellaris* Kerr., de Bornéo, mais d'une coloration générale plus claire et plus brillante; la ponctuation élytrale un peu plus épaisse que celle de la première; le sillon longeant la suture à l'extrémité des élytres nul ou à peine accusé alors qu'il est bien accentué chez les deux espèces précitées. Celles-ci n'ont pas comme l'*auripennis* une carène transversale limitant le sillon frontal et le séparant de l'épistome.

Tête grossièrement ponctuée en avant, à peine ponctuée en arrière; front profondément excavé, l'excavation sillonnée dans le fond et séparée de l'épistome par une petite carène transversale; les trois premiers articles des antennes et la base du quatrième verts; yeux gros et saillants, dépassant le prolongement des côtés du pronotum. Pronotum en trapèze, plus large que haut à la base, le sommet égal à la hauteur, couvert d'une ponctuation fine, irrégulièrement et largement espacée; les taches latérales dorées granuleuses et finement ponctuées; le disque sillonné longitudinalement au milieu, le sillon plus accentué en arrière qu'en avant, peu sensible au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et subarrondi; les côtés obliques formant vers le haut deux replis sinueux; deux fossettes superposées se remarquent de part et d'autre des côtés, la première contre la base et la seconde, un peu plus grande que celle-ci, dans la tache dorée. Élytres convexes, plus larges que le pronotum à la base, avec quelques plis le long de celle-ci, couverts de séries longitudinales et régulières de points nettement accusées sur le disque, confuses vers les côtés; ceux-ci sinueux à hauteur des hanches postérieures, brusquement atténués et dentelés jusqu'au sommet qui est obliquement tronqué, la troncature échancrée. Dessous à ponctuation excessivement fine et très dense sur les côtés, espacée au milieu; prosternum plan; extrémité du dernier segment abdominal échancrée en arc ♀, ou anguleusement ♂; pattes à ponctuation fine et très espacée.

Pseudochrysodema Iris nov. sp. — *Subovalaire, oblong, convexe en dessus, d'un vert doré à reflets irisés sur les élytres, les bords postérieurs de ceux-ci d'un rouge feu avec la marge latérale d'un bleu d'acier. Dessous vert glauque, brillant; les bords des segments abdominaux largement teintés de bleu d'acier; tarses d'un jaune clair, l'extrémité du dernier article et les ongles d'un vert métallique; antennes obscures.* — Long., 28; larg., 9 mill.

Banda (coll. Meyer Darcis).

Tête faiblement excavée et ponctuée; la ponctuation plus dense en avant qu'en arrière; front sillonné. Pronotum un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, caréné longitudinalement au milieu, impressionné de part et d'autre sur les côtés; l'impression irrégulière, allongée, sinueuse et située à une certaine distance du bord; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés obliques et un peu arqués; la base à peine bisinuée; il est couvert d'une ponctuation un peu plus dense sur les côtés que sur le disque, où se remarquent des espaces lisses, notamment la carène médiane. Écusson petit, déprimé. Élytres convexes, légèrement relevés au sommet, tronqués à l'épaule, l'extrémité inférieure de la troncature légèrement saillante en dehors; ils sont couverts de séries longitudinales de points peu apparentes sur les côtés; ceux-ci dentelés sur les bords postérieurs, du tiers supérieur au sommet. Dessous finement granuleux, sauf les parties d'un bleu d'acier, qui sont couvertes d'une ponctuation irrégulièrement espacée; marge antérieure du prosternum unie, à peine échancrée en arc; prosternum faiblement déprimé dans toute sa longueur; extrémité du dernier segment abdominal échancrée; le premier segment longitudinalement déprimé au milieu.

Pseudochrysodema cupriventris nov. sp. — *Naviculaire, assez convexe, acuminé à l'extrémité; tête cuivreuse, pronotum vert doré, élytres d'un vert bleuâtre mat, l'extrémité et les bords postérieurs teintés de bleu. Dessous vert doré ou cuivreux très éclatant; tarses jaunes, l'extrémité du dernier article et les ongles obscurs; antennes brunâtres, très obscures.* — Long., 21-28; larg., 7-9 mill.

Macassar.

Tête à peine déprimée, la dépression semi-circulaire et séparée de l'épistome par une carène irrégulière; front sillonné et moins densément ponctué que l'épistome, qui est rugueux. Pronotum transversal, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, caréné longitudinalement au milieu, irrégulièrement impressionné sur les côtés où la ponctuation est plus dense et plus grossière que sur le disque; la marge antérieure échancrée en arc et à peine sinueuse au milieu; les côtés arqués en avant avec l'angle posté-

rieur droit ; la base faiblement bisinuée. Élytres convexes, légèrement relevés à l'extrémité, tronqués à l'épaule, la troncature saillante à sa partie inférieure ; ils sont couverts de séries longitudinales de points et la marge latérale est largement dentelée du tiers supérieur au sommet. Dessous granuleux et ponctué ; marge antérieure du prosternum unie et à peine arquée ; prosternum et premier segment abdominal déprimés longitudinalement.

Paracupta auricollis nov. sp. — *Naviculaire, peu convexe, atténué à l'extrémité, d'un vert doré excessivement brillant et clair ; pronotum doré ; pattes vertes, tarses d'un jaune clair ; les côtés du pronotum avec une impression longitudinale ; les élytres ornés de part et d'autre de trois impressions : la première, à la base, irrégulière et transversale ; la deuxième, arrondie, située au milieu du disque vers le tiers antérieur, et la troisième, allongée, longeant la marge latérale à une certaine distance de celle-ci.* — Long., 25 ; larg., 8,5 mill.

Nouvelle-Guinée (Staudinger).

Ressemble beaucoup à *P. aurofoveata* Saund., de l'Australie, mais d'une coloration différente ; la dépression latérale du pronotum plus allongée, touchant presque la marge antérieure, les dépressions élytrales disposées de même, l'humérale formée par deux fossettes jumelles, la discale plus petite, arrondie, la marginale plus étroite et remontant plus haut.

Tête largement excavée, l'excavation finement granuleuse, sillonnée longitudinalement et séparée de l'épistome par une carène transversale ; antennes brunes, obscures, longues et grêles, à premier article vert. Pronotum en trapèze, plus large que haut, couvert de points fins et espacés, sillonné longitudinalement sur le disque, le sillon assez large, terminé par une fossette préscutellaire ; impressionné de part et d'autre sur les côtés, l'impression allongée, n'atteignant ni la base ni le sommet ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et subarrondi ; les côtés obliques ; la base faiblement bisinuée. Écusson très petit, lisse et transversal. Élytres de la largeur du pronotum à la base, couverts d'une ponctuation excessivement fine, disposée en vagues séries longitudinales ; sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, ensuite obliquement atténués et assez fortement dentés jusqu'au sommet ; celui-ci légèrement relevé ; les dépressions basilaires et latérales finement granuleuses dans leur fond et remplies, ainsi que celles du pronotum, d'une pulvérulence jaune. Dessous ponctué, la ponctuation plus dense sur les côtés qu'au milieu ; prosternum longitudinalement déprimé ; côtés des segments abdominaux impressionnés ; extrémité du dernier segment avec une très petite échancrure ; pattes presque lisses.

Cyphogastra nigrita nov. sp. — *Grand, allongé, atténué en avant, élargi au tiers supérieur, très acuminé à l'extrémité, entièrement noir et comme vernissé, les dépressions du pronotum et celles du dessous couvertes d'une pulvérulence jaune.* — Long., 38; larg., 13 mill.

Nouvelle-Guinée : Kapaur (coll. Meyer Darcis).

Beaucoup plus grand et plus acuminé en arrière que le *Cyph. tuberculata* Ths., des Nouvelles-Hébrides, et que le *Cyph. flavimana* Lansb., de Timor, il a les côtés du pronotum moins parallèles, la ponctuation élytrale plus nette et plus accentuée, diminuant graduellement d'intensité de la base au sommet; enfin, il est entièrement noir et brillant avec quelques reflets irisés à l'apex.

Tête assez allongée, triangulairement déprimée en avant, sillonnée dans toute sa longueur; vertex séparé du front par une carène flexueuse. Pronotum un peu plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, tronqué en avant avec la partie inférieure de la troncature saillante en dehors; le disque sillonné longitudinalement; les dépressions latérales nettes, profondes, arquées et surmontées d'une fossette; les côtés un peu obliques. Élytres relevés et à peine dentelés au sommet. Dessous brillant, noir; plaque abdominale grande et saillante; pelotes tarsiennes fauves.

Cyphogastra lateralis nov. sp. — *Allongé, peu convexe, atténué en arrière; tête et pronotum noirs, avec le fond des dépressions pourpré et obscur; élytres noirs à reflets verdâtres, avec une tache verte, légèrement irisée et longeant le bord extérieur sans atteindre les extrémités. Dessous violacé pourpré et brillant.* — Long., 29; larg., 9 mill.

Ombay.

Espèce voisine de *Cyph. cyanipes* Kerr., de la Nouvelle-Guinée, mais d'une coloration différente; les fossettes et dépressions thoraciques beaucoup moins nettes et plus rugueuses, la ponctuation élytrale plus fine; le sillon médian du pronotum plus large et moins linéaire.

Cyphogastra viridis nov. sp. — *Allongé, acuminé à l'extrémité, l'apex légèrement relevé; tête et pronotum d'un vert doré brillant, élytres d'un vert mat avec l'extrémité bleue. Dessous vert doré très brillant; tarses et antennes noirs.* — Long., 32-38; larg., 10-12 mill.

Nouvelle-Guinée.

Très voisine de *Cyph. Wallacei* H. Deyr., de Batchian, mais d'une coloration plus claire, la disposition des dépressions frontales différente, les côtés du pronotum moins obliques, ses fossettes plus accentuées; l'angle antérieur échancré.

Tête irrégulièrement ponctuée, très grossièrement en avant, fai-

blement en arrière; front excavé, l'excavation formant deux fossettes dont l'antérieure, plus large que la postérieure, est séparée de l'épistome par une carène transversale; yeux bordés intérieurement par un sillon. Pronotum en trapèze avec les angles antérieurs échancrés, finement et irrégulièrement ponctué sur le disque, grossièrement sur les côtés; longitudinalement sillonné sur le disque, le sillon large et finement pointillé; les dépressions latérales grandes, irrégulières, formant de part et d'autre une grande fossette anguleuse surmontée de deux fossettes plus petites et situées, l'une dans l'échancrure antérieure, l'autre à côté de celle-ci, vers le sillon médian; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian faiblement échancré, les côtés un peu obliques, plus étroits en avant qu'en arrière, avec l'angle postérieur aigu et l'antérieur tronqué; la base bisinuée. Écusson lisse, punctiforme. Élytres de la largeur du pronotum à la base, obliquement tronqués à l'épaule, couverts d'une ponctuation disposée en vagues séries longitudinales et diminuant graduellement d'intensité de la base au sommet, celui-ci légèrement relevé et dentelé; les côtés légèrement sinueux à hauteur des hanches postérieures, faiblement élargis vers le milieu, brusquement atténués ensuite jusqu'à l'extrémité. Dessous à ponctuation inégale, irrégulièrement espacée; prosternum lisse, sillonné longitudinalement, le sillon déchiqueté sur ses bords; les dépressions abdominales disposées suivant quatre séries longitudinales, dont deux latérales et deux prélatérales, remplies, ainsi que les dépressions sternales, d'une pulvérulence jaune; pattes finement ponctuées.

Cyphogastra cupripennis nov. sp. — *Pisciforme, acuminé à l'extrémité; celle-ci légèrement relevée; tête, pronotum et élytres d'un vert doré brillant, l'extrémité de ceux-ci d'un pourpré cuivreux. Dessous vert doré, abdomen cuivreux, très brillant.* — Long., 31; larg., 10 mill.

Nouvelle-Bretagne (Fairmaire).

Assez voisine de *Cyph. Mniszechi* H. Deyr., d'Amboine, mais moins robuste, moins acuminée au sommet; les fossettes thoraciques plus grandes et plus nettes; le pronotum à peu près symétrique, mais le calus inférieur de la troncature latérale antérieure moins saillant. Elle est également voisine de *Cyph. viridis* qui précède et par conséquent de *Cyph. Wallacei* H. Deyr., mais moins acuminée au sommet et différente quant aux détails, les côtés du pronotum plus évasés vers le haut, avant la troncature de l'angle antérieur.

Tête irrégulièrement ponctuée, la ponctuation épaisse en avant et rare en arrière où se remarquent quelques espaces lisses; dépres-

sion frontale formée par deux fossettes superposées, la postérieure petite, l'antérieure un peu plus grande et séparée de l'épistome par une vague carène transversale. Pronotum transversal, quadrangulaire; les angles antérieurs obliquement tronqués; couvert d'une ponctuation éparse et très irrégulière sur le disque; les côtés rugueux; le sillon médian large; les dépressions latérales grandes, profondes, plus accentuées, mais ayant la même allure que chez le *Cyph. viridis* qui précède; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large; les côtés droits, légèrement cintrés avec l'angle postérieur droit et l'antérieur tronqué. Écusson petit, quadrangulaire, un peu allongé. Élytres de la largeur du pronotum et impressionnés de part et d'autre vers les côtés à la base, couverts d'une ponctuation diminuant insensiblement d'intensité de la base à l'extrémité et disposée en séries longitudinales; tronqués à l'épaule, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis vers le milieu, atténués ensuite suivant une courbe peu prononcée jusqu'au sommet; celui-ci dentelé. Dessous irrégulièrement ponctué; prosternum profondément sillonné, le sillon plus large en avant qu'en arrière; les dépressions abdominales disposées suivant quatre séries longitudinales couvertes d'une efflorescence jaune; pattes finement ponctuées.

Cyphogastra impressa nov. sp. — *Naviculaire, atténué à l'extrémité, d'un brun de poix brillant en dessus avec le fond des dépressions thoraciques et élytrales bronzé; dessous bronzé pourpré très brillant; pattes verdâtres.* — Long., 31; larg., 9,5 mill.

Ombay.

Du groupe de *Cyph. farinosa* Fab. et assez voisine de cette espèce, mais avec le pronotum moins carré, ses angles moins nets et moins saillants; les fossettes plus larges et plus accentuées; le sillon élytral qui longe la suture plus profond, les autres sillons nuls.

Sphenoptera nitens nov. sp. — *Ovalaire, allongé, convexe, bronzé obscur à reflets pourprés en dessus, front brillant, cuivreux pourpré; dessous cuivreux pourpré et brillant, antennes et tarses noirs.* — Long., 10-13; larg., 3-4 mill.

Aden.

Voisin de *Sph. Konbirensis* Kerr., de l'Inde, mais plus svelte, plus acuminé en arrière, le front plus étroit, le pronotum plus allongé et moins large en avant, à ponctuation plus espacée et plus irrégulière, la dent médiane qui termine les élytres très saillante.

Tête irrégulièrement ponctuée; front déprimé en avant et longitudinalement sillonné entre les yeux, le sillon limité de part et d'autre par un empâtement lisse et irrégulier. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, vaguement

sillonné au milieu, couvert d'un pointillé excessivement fin et de points assez gros, irrégulièrement espacés, plus épais et plus denses sur les côtés que sur le disque ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi ; les côtés un peu obliques et régulièrement arqués avec la carène latérale droite, atteignant presque la marge antérieure ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson large, subcordiforme, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum, couverts de séries longitudinales de points et de plis transversaux irréguliers, peu sensibles vers la suture ; les côtés arrondis à l'épaule, à peine sinueux à hauteur des hanches postérieures, droits ensuite jusqu'au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite suivant une courbe régulière mais peu accentuée jusqu'au sommet ; celui-ci tridenté de part et d'autre ; les dents latérales courtes et aiguës, les médianes assez fortes. Dessous irrégulièrement ponctué ; prosternum plan, grossièrement et inégalement ponctué ; dernier segment abdominal sillonné le long du bord.

Sphenoptera inermis nov. sp. — *Ovalaire, écourté, peu convexe, noir à reflets pourprés en dessus, le pronotum trisillonné longitudinalement, les élytres rugueux, sillonnés le long de la suture, tronqués et inermes à l'extrémité ; dessous noir bleuâtre brillant.* — Long., 7,5 ; larg., 2,5 mill.

Chine.

Du groupe de *Sph. sulcata* Mars., d'Égypte, mais beaucoup moins robuste et moins élargi, la tête relativement plus large, le pronotum moins convexe, les élytres plus rugueux, séparément arrondis à l'extrémité et inermes.

Tête rugueuse, irrégulièrement ponctuée, avec deux empâtements lisses, frontaux, séparés par un sillon longitudinal. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, très rugueux et vaguement sillonné de part et d'autre sur les côtés, nettement sillonné au milieu, le sillon médian densément, le disque faiblement ponctué ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec la carène marginale droite et atteignant presque la marge antérieure ; la base bisinuée avec le lobe médian étroit et échancré en arc. Écuson arqué en avant, arrondi sur les côtés, bisinué au sommet. Élytres rugueux et inégaux, de la largeur du pronotum à la base et longitudinalement déprimés le long de la suture, couverts d'une ponctuation inégale et de rugosités transversales et vermiculées ; les côtés presque droits jusqu'au tiers supérieur, ensuite obliquement atténués jusqu'au sommet ; celui-ci obliquement tronqué et séparément arrondi avec un petit vide anguleux sutural. Dessous

irrégulièrement ponctué; prosternum plan, sans sillon ni stries marginales; dernier segment abdominal sillonné le long du bord.

Sphenoptera chinensis nov. sp. — *Oblong, peu convexe, entièrement bronzé, plus clair et plus brillant en dessous qu'au-dessus.* — Long., 8; larg., 2,3 mill.

Chine.

Facies de *Sph. Solskyi* Beck., du Turkestan et du Caucase, mais plus étroit, le pronotum plus allongé, les élytres arrondis à l'extrémité avec une petite dent suturale.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front avec deux plaques lisses et obliques. Pronotum convexe, presque aussi large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué, la ponctuation plus dense sur les côtés que sur le disque; celui-ci vaguement sillonné; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec la carène marginale presque droite et atteignant à peine le quart antérieur; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum à la base, finement granuleux et ponctués, couverts de vagues séries longitudinales de points; saillants sur les côtés à l'épaule, légèrement sinueux à hauteur des hanches postérieures, à peine élargis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci inerme sur les côtés et au milieu, séparément arrondi avec, de part et d'autre, une très petite dent apicale. Dessous irrégulièrement ponctué; prosternum plan, sans sillon ni stries marginales; dernier segment abdominal sillonné le long du bord.

Torresita parallela nov. sp. — *Oblong, peu convexe, atténué en avant et en arrière; tête bronzée; pronotum noir, légèrement bronzé; élytres d'un noir mat, un peu brillants sur le disque, où ils sont moins rugueux que sur les côtés. Dessous brillant, noir de fumée.* — Long., 10; larg., 3,8 mill.

Queensland (par Staudinger).

Plus sombre, plus parallèle et moins dilaté que les *Torr. œnea* Thoms. et *dilatata* Redt., la coloration du dessus est plus mate.

Tête à peine convexe, finement granuleuse et à peine ponctuée, avec deux très petits espaces lisses au milieu du front. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense et très régulièrement espacée; le milieu du disque à peine sillonné et offrant, de part et d'autre du sillon, entre celui-ci et les côtés et plus près de la base que de la marge antérieure, une très vague fossette; la base faiblement échancrée en arc; les côtés arqués avec l'angle inférieur très petit, aigu

et légèrement saillant en dehors. Écusson petit, tronqué à la base. Élytres finement chagrinés, séparément arrondis à l'extrémité, celle-ci et les côtés très finement dentés en scie. Dessous ponctué; extrémité du dernier segment abdominal bidenté, chacune des dents formant le prolongement d'une carène oblique.

Melobasis melanura nov. sp. — *Oblong ovale, allongé, légèrement élargi au tiers supérieur, atténué à l'extrémité, entièrement noir en dessus avec quelques reflets élytraux ainsi que l'écusson d'un cuivreux sombre. Dessous d'un bronzé pourpré sombre; antennes obscures, verdâtres.* — Long., 9; larg., 3 mill.

Australie (Chevrolat).

De moitié plus petit que *Mel. nervosa* Boild., mais avec les côtes élytrales à peine sensibles.

Tête plane, à ponctuation dense, fine, un peu plus épaisse en avant qu'en arrière, couverte d'un duvet court et blanchâtre; épistome bilobé avec une échancrure anguleuse médiane. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, fine, un peu plus épaisse sur les côtés que sur le disque, et de petites rides transversales et sinueuses; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arrondi; les côtés régulièrement arqués; la base bisinuée. Écusson subtriangulaire. Élytres peu convexes, couverts de points plus épais sur les côtés que sur le disque, avec des côtes longitudinales très peu accusées; dentelés sur les côtés à partir du milieu, les dents augmentant progressivement d'intensité vers le sommet; celui-ci conjointement arrondi. Dessous couvert d'un duvet blanchâtre assez espacé; abdomen couvert de points allongés; extrémité du dernier segment abdominal échancré en demi-cercle, l'échancrure limitée de part et d'autre par une forte dent et surmontée d'une courte carène.

Melobasis cupricollis nov. sp. — *Oblong ovale, élargi au tiers supérieur, d'un vert sombre en dessus avec, sur le pronotum, une vague tache cuivreuse. Dessous d'un vert clair et très brillant.* — Long., 9,5; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de *Mel. Lathami* Cast. et Gory, mais moins allongé, les côtés du pronotum plus obliques en avant et rentrants en arrière, les côtes élytrales nulles.

Tête plane, densément et régulièrement ponctuée. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulière, moins dense et un peu plus épaisse que celle de la tête, avec, de part et d'autre, une très petite fossette latérale allongée, située un peu plus près de la base que du sommet

et une vague dépression basilaire et médiane; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et peu arqué; les côtés un peu obliques en avant jusque vers le quart inférieur où ils s'infléchissent vers la base pour former un angle inférieur obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson petit, punctiforme. Élytres couverts de séries longitudinales de points alternant avec des côtes très vagues, à peine accusées; les côtés un peu rugueux, grossièrement ponctués et ridés transversalement çà et là; ils sont dentés du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi à l'extrémité et légèrement creusé le long de la suture. Sternum grossièrement et inégalement ponctué; abdomen finement granuleux; fémurs ridés transversalement; extrémité du dernier segment abdominal bidentée, les dents séparées par une échancrure arquée.

Melobasis cuprina nov. sp. — *Elliptique, assez convexe, d'un bronzé brillant en dessus avec des bandes transverses et élytrales peu sensibles et d'un cuivreux pourpré. Dessous bronzé et brillant.* — Long., 11,5; larg., 4 mill.

Australie.

Un peu plus convexe que *Mel. placida* Thoms., la coloration différente, les côtés du pronotum plus arqués, la base plus sinueuse et les élytres un peu plus granuleux.

Tête peu convexe, couverte d'une ponctuation assez dense et très régulière en arrière, plus grossière en avant où ses intervalles forment des plis longitudinaux; épistome assez avancé et faiblement échancré en arc. Pronotum convexe, couvert d'une ponctuation plus épaisse et plus espacée que celle de la tête; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé, large et arqué; les côtés très arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Élytres assez convexes, couverts de points beaucoup plus grossiers, plus denses et plus irréguliers sur les côtés que sur le disque; la dentelure élytrale peu accentuée, mais plus sensible en se rapprochant du sommet; celui-ci conjointement arrondi. Dessous couvert d'une ponctuation simulant la contre-empreinte de très petites écailles d'où émergent des points couchés et blanchâtres, très peu denses; extrémité du dernier segment abdominal bidentée et étroitement échancrée en arc.

Melobasis nitidiventris nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe; tête et pronotum noirâtres à reflets violacés; élytres obscurs, violacés sur les côtés; dessous pourpré sombre et brillant.* — Long., 7,5; larg., 2,5 mill.

Australie.

Du groupe des *Mel. rotundicollis* Blackb., *simplex* Germ., *obscurella* et *viridiobscura* Thoms.; un peu moins robuste que la première,

le dessous à peu près semblable pour la coloration et la ponctuation, les côtés du pronotum moins arrondis.

Tête plane, granuleuse, densément et régulièrement ponctuée; épistome assez étroit, tronqué en avant. Pronotum plus large que haut, peu convexe, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation aréolée et de rides transversales et sinueuses; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés un peu obliques et régulièrement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson semi-circulaire. Élytres rugueux et densément ponctués sur leur moitié extérieure; la région suturale à peine ponctuée avec des vagues stries longitudinales et quelques points épars; les côtés faiblement dentelés du milieu au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous granuleux, plus lisse et plus brillant que le dessus; extrémité du dernier segment abdominal subtronquée, à peine échancrée.

Melobasis violacea nov. sp. — *Petit, oblong ovale, peu convexe; tête et pronotum d'un violacé pourpré; élytres violets avec les côtés bleuâtres. Dessous bronzé pourpré; abdomen cuivreux; antennes et tarses bleus.* — Long., 7; larg., 2,2 mill.

Australie (Staudinger).

Voisin de *Mel. nitidiventris* Kerr., qui précède, mais moins robuste, un peu plus parallèle sur les côtés et le système de coloration entièrement différent.

Tête finement granuleuse et régulièrement ponctuée. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points fins et régulièrement espacés sur le disque et, sur les côtés, de gros points enfoncés dont le contour forme un réseau de mailles arrondies; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson petit, subelliptique et transversal. Élytres couverts de séries longitudinales de points et, de part et d'autre, d'une vague côte longeant la suture à une certaine distance de celle-ci; les côtés légèrement ridés; les rides inégales, transversales et simulant des petites écailles; la marge latérale dentelée du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous moins rugueux que le dessus, irrégulièrement ponctué.

Melobasis cœruleiventris nov. sp. — *Oblong ovale, assez convexe; tête bleuâtre et obscure; pronotum bronzé; élytres bleus avec la suture, la marge latérale supérieure, l'apex, une bande transversale préapicale et une bande oblique partant de l'épaule d'un pourpré violacé. Dessous bleu.* — Long., 9; larg., 3,5 mill.

Australie.

Un peu moins robuste que *Mel. subfulgurans* Thoms., dont il a le facies, le dessin élytral à peu près semblable, mais plus obscur; la coloration différente.

Tête finement et régulièrement ponctuée; la ponctuation plus épaisse en avant qu'en arrière. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulièrement espacée, un peu plus dense et plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés arqués en avant et droits en arrière; la base à peine bisinuée. Écusson semi-circulaire. Élytres vaguement striés, les stries sensibles seulement vers la suture, couverts d'une ponctuation fine, disposée en séries assez régulières vers la moitié intérieure, dense et irrégulière sur la moitié extérieure; la marge extérieure dentelée du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement granuleux et irrégulièrement ponctué, plus rugueux en avant qu'en arrière.

Melobasis viridiventris (Faim. mss.) nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, d'un vert doré brillant en dessus. Dessous vert bleuâtre, très brillant.* — Long., 10; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de *Mel. viridis* Saund., mais le pronotum plus allongé, ses côtés moins obliques et régulièrement arqués, les côtes élytrales moins nettes, à peine sensibles, le dessous un peu moins brillant.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée, la ponctuation plus grosse en avant qu'en arrière; épistome faiblement échancré en arc. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez fine et assez régulière sur le disque, inégale et plus grossière sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large, assez avancé et arqué; les côtés régulièrement arqués; la base bisinuée. Écusson punctiforme, tronqué à la base. Élytres finement et régulièrement ponctués, moins fortement que le pronotum, avec deux vagues côtes longeant la suture; les côtés dentelés du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement et régulièrement ponctué, la ponctuation un peu plus épaisse en avant qu'en arrière; extrémité du dernier segment abdominal échancrée, l'échancrure tronquée, ses côtés formant un angle droit avec le fond.

Melobasis costipennis nov. sp. — *Allongé, peu convexe, subovalaire, d'un beau vert clair et très brillant.* — Long., 11,5; larg., 3 mill.

Australie.

Très voisin de *Mel. Lathami* Cast. et Gory, quant au facies et à la disposition des côtes élytrales, mais un peu plus étroit, les côtés du

pronotum un peu plus arqués et la coloration entièrement différente.

Tête à ponctuation assez forte, couverte d'une villosité blanche. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation plus fine que celle de la tête, régulièrement espacée, un peu plus dense sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian large, avancé et très arqué; les côtés obliques en avant, arqués au delà du milieu; la base à peine sinueuse. Écusson lisse, transversal, tronqué à la base. Élytres finement et régulièrement ponctués avec, de part et d'autre, quatre côtes lisses peu accentuées, les suturales plus nettes que les marginales; la marge latérale dentelée un peu au delà du milieu jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement et régulièrement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal sinueuse au milieu et unidentée de part et d'autre.

Melobasis concolor nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, légèrement élargi au tiers supérieur, d'un vert clair un peu doré en dessus; dessous vert bleuâtre.* — Long., 10,5; larg., 3 mill.

Australie.

A peu près de la taille et de la forme de *Mel. cupriceps* Kirb., mais un peu plus rugueux en dessus et moins brillant en dessous; le front mat.

Tête couverte d'une ponctuation très dense, un peu plus épaisse en avant qu'en arrière; épistome faiblement échancré en arc. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation plus dense sur les côtés que sur le disque, dont les points sont transversaux; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arrondi; les côtés régulièrement arqués; la base à peine bisinuée. Écusson punctiforme, subtriangulaire. Élytres à ponctuation, fine, dense et irrégulièrement espacée, présentant des très vagues côtes longitudinales et lisses, dentelés sur les côtés du tiers postérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous irrégulièrement ponctué. Extrémité du dernier segment abdominal tridentée, la dent médiane un peu moins forte que les deux latérales.

Melobasis callichloris (Chevrol. mss.) nov. sp. — *Petit, assez convexe, entièrement vert, un peu plus brillant en dessous qu'au-dessus; antennes noires, tarses bleus.* — Long., 7; larg., 2,3 mill.

Australie.

Voisin de *Mel. viridiventris* Kerr., qui précède, mais un peu moins rugueux; le front uni, sans sillon; les côtés du pronotum plus arrondis, les élytres plus régulièrement ponctués.

Tête finement et densément ponctuée; épistome tronqué. Prono-

tum assez convexe, plus étroit en avant qu'en arrière, plus large que haut, couvert d'une ponctuation dense, fine et régulièrement espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué; les côtés régulièrement arqués; la base bisinuée. Écusson petit, sublongitudinal, tronqué à la base, arrondi au sommet. Élytres couverts d'une très fine ponctuation assez régulièrement espacée, dentelés sur les côtés un peu au delà du milieu jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal tronquée et limitée de part et d'autre par une longue épine.

Melobasis vicina nov. sp. — *Oblong ovale, allongé, un peu élargi au tiers supérieur, entièrement vert avec la moitié postérieure des élytres bronzée, l'apex cuivreux et quelques reflets pourprés sur les côtés de l'abdomen.* — Long., 9,5; larg., 3 mill.

Australie.

Un peu moins granuleux que *Mel. concolor* Kerr., qui précède, les yeux moins saillants et la coloration différente. Tête finement et régulièrement ponctuée, la ponctuation un peu plus épaisse en avant qu'en arrière; épistome faiblement échancré en arc. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, épaisse et régulièrement espacée, laissant au milieu une vague ligne longitudinale lisse; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué; les côtés régulièrement mais faiblement arqués; la base bisinuée. Écusson subcordiforme, déprimé longitudinalement au milieu. Élytres couverts d'une ponctuation assez dense, irrégulièrement espacée et dont les intervalles forment des vagues rides transversales et sinueuses; dentelés sur les côtés du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous irrégulièrement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal profondément échancrée en arc, l'échancrure limitée de part et d'autre par une longue épine.

Melobasis laticeps nov. sp. — *Subparallèle, les yeux saillants; d'un vert sombre en dessus, la marge latérale postérieure des élytres largement bordée de pourpre. Dessous vert brillant.* — Long., 8; larg., 3 mill.

Australie (Fairmaire).

Tête finement et régulièrement ponctuée; épistome faiblement échancré en arc. Pronotum plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, très dense et régulièrement espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés obliques en avant et arrondis en arrière avec l'angle postérieur abaissé; la base bisinuée avec le lobe médian très large et arqué. Écusson très petit, déprimé au

milieu. Élytres à fond finement granuleux, avec des rides transversales sinueuses plus accusées sur les côtés que vers la suture; les côtés dentelés du tiers supérieur au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement granuleux et irrégulièrement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal tronquée.

Melobasis terminata nov. sp. — *Oblong, peu convexe, d'un beau vert doré clair avec l'extrémité des élytres d'un rouge feu et la suture d'un cuivreux sombre.* — Long., 5,3; larg., 1,8 mill.

Melbourne (par Staudinger).

Faciès de *Mel. innocua* Thoms.; s'en distingue par la coloration de l'apex.

Tête finement granuleuse. Pronotum peu convexe, à ponctuation fine, régulière, très dense, plus accentuée sur les côtés que sur le disque. Élytres finement granuleux, séparément arrondis au sommet et dentelés. Dessous finement granuleux.

Melobasis viridicollis nov. sp. — *Subparallèle, assez convexe, un peu élargi au tiers supérieur, entièrement vert; les élytres pourprés sur les bords extérieurs, cuivreux éclatant le long de la suture; le pourtour de l'écusson et, de part et d'autre, une large bande longitudinale médiane d'un vert bleuâtre et brillant.* — Long., 10; larg., 3,3 mill.

Australie.

Se distingue de *Mel. cupreovittata* Saund. par l'absence de taches cuivreuses sur le pronotum dont la ponctuation est plus nette et plus régulière, par les côtes élytrales un peu plus accentuées et par la coloration plus brillante des élytres.

Tête finement et régulièrement ponctuée; épistome faiblement échancré. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et régulièrement espacée, plus dense sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arqué; les côtés un peu obliques, faiblement mais régulièrement arqués; la base bisinuée. Écusson subtransversal et subpentagonal. Élytres couverts d'une ponctuation irrégulière, plus fine et plus éparse le long de la suture que sur les côtés et le disque; présentant des côtes longitudinales peu accusées; dentelés sur les côtés du milieu au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement et irrégulièrement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal faiblement échancrée en arc.

Melobasis auronotata nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, tête et pronotum d'un vert doré clair, le dernier avec une tache cuivreuse discale; élytres bleus, avec de part et d'autre, une étroite bande suturale atteignant à peine le tiers antérieur, une tache semi-circulaire*

humérale, une bande transversale médiane interrompue à la suture et une deuxième bande préapicale, parallèle à la première et plus petite que celle-ci, le tout d'un vert doré clair avec un bord très étroit, d'un rouge feu. Dessous vert métallique clair et très brillant. — Long., 9; larg., 3,5 mill.

Australie (Staudinger).

Moins robuste que *Mel. pyritosa* Hope, dont elle se rapproche beaucoup, mais le pronotum moins convexe et moins arrondi sur les côtés, les taches élytrales plus nettes, plus petites et mieux limitées, la coloration différente et les élytres, avec de part et d'autre, deux côtes médianes sinueuses.

Tête densément et régulièrement ponctuée; épistome faiblement échancré. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulièrement espacée, plus dense sur les côtés que sur le disque et laissant, au milieu de ce dernier, une vague ligne longitudinale lisse ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian peu arqué; les côtés obliques et faiblement arqués; la base à peine bisinuée. Écusson transversal, elliptique. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées dont les intervalles sont légèrement saillants et forment des vagues côtes irrégulières; les côtés dentelés du tiers supérieur au sommet, celui-ci acuminé de part et d'autre, laissant un vide anguleux sutural. Dessous irrégulièrement ponctué ; extrémité du dernier segment abdominal échancrée, l'échancrure limitée de part et d'autre par une forte dent aiguë.

Melobasis miranda nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, d'un beau vert doré avec les élytres ornés de taches et de bandes cuivreuses disposées comme suit : la suture, jusqu'au tiers antérieur, est cuivreuse; au tiers antérieur, la couleur cuivreuse se bifurque en avant de façon à former, sur chaque élytre, une tache allongée discale, un peu oblique, et touchant presque la base; la bordure extérieure est également cuivreuse du sommet au tiers postérieur, où elle rejoint une bande transversale, commune aux deux élytres et formant une croix avec la suture.* — Long., 6; larg., 2 mill.

Melbourne (par Staudinger).

Voisine de *Mel. faceta* Thoms., mais moins robuste et le dessin élytral différent.

Tête finement granuleuse. Pronotum à ponctuation très fine et très dense. Élytres plus rugueux que le pronotum, granuleux, ponctués, dentelés sur les côtés postérieurs et au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous finement granuleux et ponctué.

Melobasis amabilis nov. sp. — *Étroit, allongé, peu convexe, tête et pronotum d'un vert clair à reflets cuivreux; élytres d'un vert*

doré brillant avec une bande sinueuse au tiers antérieur, une seconde bande préapicale, l'extrémité, la suture de la première bande au sommet et les côtés postérieurs de la seconde bande à l'extrémité, le tout d'un pourpré violacé. Dessous vert métallique et très brillant. — Long., 6; larg. 1,7 mill.

Australie : Moreton-Bay.

Un peu plus étroit et moins robuste que *Mel. gratiosissima* Thoms., dont il se rapproche par le dessin élytral. La coloration est entièrement différente.

Tête finement et régulièrement ponctuée; épistome tronqué. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian à peine arqué; les côtés un peu arqués en avant et sinueux en arrière avec l'angle postérieur légèrement saillant en dehors; la base bisinuée. Écusson pentagonal. Élytres finement granuleux et couverts d'une ponctuation irrégulièrement espacée, les parties vertes un peu plus rugueuses que les pourprées; les côtés dentelés du milieu au sommet; celui-ci séparément arrondi. Dessous irrégulièrement ponctué; extrémité du dernier segment abdominal échancrée en arc et unidentée de part et d'autre.

Briseis acuminata nov. sp. — *Allongé, peu convexe, très acuminé au sommet, d'un noir verdâtre brillant en dessus avec l'apex, les antennes et les tarses bleus. Dessous vert noirâtre glauque et très brillant.* — Long., 13,5; larg., 3,8 mill.

Queensland (par Staudinger).

Se distingue surtout du *Br. conica* Cast. et Gory par l'extrémité des élytres très acuminée et par l'écusson concolore.

Tête finement chagrinée. Pronotum transversal, ponctué, vaguement sillonné au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés droits; la base tronquée avec l'angle postérieur un peu abaissé. Écusson petit, semicirculaire, sillonné au milieu. Élytres de la largeur du pronotum à la base, couverts de stries ponctuées; dentelés sur les bords à partir du milieu jusqu'au sommet; celui-ci très acuminé. Dessous couverts de points allongés; prosternum large, plan, lisse, trifide à l'extrémité; dernier segment abdominal bidenté au sommet.

Anilara sulcipennis nov. sp. — *Oblong, plan en dessus, d'un noir mat et comme velouté sauf le milieu du disque élytral, le long de la suture, qui est brillant et très légèrement bronzé; élytres avec de larges plis longitudinaux et sinueux. Dessous rugueux, noir brillant.* — Long., 6,5; larg., 2,3 mill.

Australie : Rockhampton.

Plus grand, plus large et plus robuste que *An. Adelaïdina* Hope, le sillon frontal plus étroit, le pronotum non sillonné au milieu, ses bords non dilatés; les élytres plus nettement plissés en long.

Tête finement granuleuse; front sillonné en arrière, déprimé en avant, la dépression subtriangulaire et limitée par deux vagues carènes. Pronotum plus mat et plus finement granuleux que la tête, vaguement déprimé à la base, de part et d'autre, d'un sillon médian peu accentué et visible seulement au-dessus de l'écusson; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués en avant et droits à partir du milieu jusque la base; celle-ci bisinuée avec un très large lobe médian peu arqué. Écusson allongé, en triangle curviligne. Élytres couverts de petites rides transversales, un peu plus rugueux que le pronotum avec, de part et d'autre, une côte très sinueuse formant le prolongement du calus huméral et une seconde côte plus courte, oblique, allant du milieu de la base au tiers antérieur, ces deux côtes limitant deux larges dépressions inégales; le sommet séparément arrondi; les côtés postérieurs très finement dentelés du milieu à l'extrémité. Dessous finement granuleux.

Anilara sulcicollis nov. sp. — *Oblong, allongé, plan en dessus; tête d'un noir verdâtre; pronotum d'un noir mat; élytres d'un bronzé mat, très obscur, avec une tache transversale, préapicale, subquadrangulaire, commune aux deux élytres, noire et bordée de bronzé plus clair que le fond de l'élytre. Dessous noir; pattes verdâtres.* — Long., 5; larg., 1,8 mill.

Australie.

A peu près de la taille de *An. Adelaïdina* Hope, mais les côtés du pronotum moins arrondis, son sillon médian moins profond; les élytres sans sillons ni plis longitudinaux, avec une tache noire discale obscure très caractéristique, noire quand on regarde l'insecte directement en dessus et paraissant au contraire plus brillante que le restant de l'élytre vue sous un rayon oblique.

Tête granuleuse, couverte d'une ponctuation dense, ocellée et régulièrement espacée; front avec des vagues dépressions inégales. Pronotum granuleux, finement chagriné, longitudinalement sillonné au milieu; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés très arqués au milieu et sinueux en arrière avec l'angle postérieur saillant en dehors et aigu; la base à peine bisinuée. Écusson très petit, allongé. Élytres finement chagrinés et couverts de granulations simulant des très petites écailles, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous finement granuleux.

Anilara nigrita nov. sp. — *Petit, étroit, oblong, assez convexe, entièrement noir; une tache allongée, plus brillante que la nuance foncière, sur la partie supérieure des élytres et commune à ceux-ci.* — Long., 4,5; larg., 1,6 mill.

Australie.

Plus petit, plus écourté, plus convexe et plus noir que *sulcicollis* qui précède; les côtés du pronotum plus dilatés; ce dernier sans sillon médian; la tache commune aux deux élytres n'est pas aussi nette, se fond insensiblement dans la nuance foncière, n'est pas aréolée de bronzé ; les élytres sont sans plis longitudinaux.

Tête finement granuleuse. Pronotum couvert d'une ponctuation ocellée très régulière et très dense; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés très arqués au milieu, à peine sinueux vers la base avec l'angle postérieur obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson allongé, en triangle curviligne. Élytres granuleux, assez convexes, conjointement arrondis à l'extrémité. Dessous très finement granuleux.

Anilara cuprescens nov. sp. — *Oblong, allongé, plan en dessus, d'un bronzé rougeâtre très obscur, la partie supérieure et suturale des élytres plus claire que le restant du corps.* — Long., 4,5; larg., 1,5 mill.

Australie.

Voisin de *An. nigrita* qui précède, mais le pronotum relativement plus long, les côtés du pronotum un peu plus dilatés, non arrondis, mais subanguleux, la tache discale autrement disposée.

Tête à ponctuation excessivement fine, très dense et très régulière. Pronotum couvert de points ocellés très fins et très denses et présentant trois vagues fossettes dont une médiane, située un peu plus près de la marge antérieure que de la suture, et les deux autres, latérales, situées un peu plus bas que la précédente, dans l'angle formé par les bords du pronotum; la marge antérieure arquée avec un vague lobe médian subanguleux; les côtés subanguleusement arqués avec l'angle postérieur très obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson très petit, triangulaire. Élytres finement et régulièrement chagrinés, obliquement tronqués à l'extrémité, la troncature formant un petit vide anguleux sutural. Dessous finement granuleux.

Anilara uniformis (Mac Leay mss.) nov. sp. — *Elliptique, assez convexe en dessus, d'un bronzé très obscur, la tache discale des élytres à peine sensible.* — Long., 3-4,7; larg., 1-2 mill.

Australie; Nouvelle-Zélande.

La forme franchement elliptique, le dessus convexe, les bords inférieurs du pronotum droits, juxtaposés aux élytres, distinguent cette espèce des précédentes.

Tête finement granuleuse, à ponctuation fine, très dense et très

régulière. Pronotum couvert d'une série de petites rides sinueuses et transversales très serrées et formant, sur les côtés, un réseau de mailles arrondies; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec l'angle postérieur droit et légèrement abaissé sur les élytres. Écusson en triangle allongé. Élytres finement et très régulièrement granuleux, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous granuleux.

Anilara convexa nov. sp. — *Subovalaire, convexe, entièrement noir, un peu plus large vers le tiers postérieur.* — Long., 5; larg., 2 mill.

Australie.

Différent de l'*uniformis* qui précède par les côtés non parallèles, légèrement élargis au tiers supérieur.

Tête couverte de points ocellés très fins et très denses, régulièrement espacés et de poils longs, couchés, longitudinalement disposés en séries peu serrées. Pronotum couvert d'une ponctuation semblable à celle de la tête; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés un peu obliques, faiblement et régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus et un peu abaissé; la base faiblement bisinuée. Écusson et triangle curviligne. Élytres chagrinés, granuleux, couverts de rugosités simulant des petites écailles très régulières, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous finement granuleux.

Anthaxia chinensis nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, d'un noir verdâtre terne en dessus avec les côtés du pronotum d'un rouge feu ou d'un vert doré très brillant. Dessous vert doré brillant.* — Long., 5,5; larg., 1,8 mill.

Hong-Kong (par Staudinger).

Espèce voisine, quant au facies, de l'*Ant. discicollis* Cast. et Gory, de Grèce et de Syrie, mais un peu plus robuste et d'une coloration générale plus sombre.

Tête finement granuleuse. Pronotum plus large que haut, un peu plus large en avant qu'en arrière, couvert d'un réseau de mailles un peu plus larges sur les côtés que sur le disque et dont les intervalles sont très finement granuleux; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés très arqués, leur plus grande largeur résidant au tiers antérieur; la base tronquée. Écusson subarrondi au sommet, tronqué à la base. Élytres mats, chagrinés. Dessous finement granuleux et ponctué.

Belionota mindorensis nov. sp. — *Ovalaire allongé, d'un noir verdâtre à légers reflets irisés en dessus, les côtés inférieurs du pronotum*

légèrement pourprés. Dessous entièrement noir. — Long., 22; larg., 8 mill.

Mindoro (Staudinger).

Assez voisin de *Bel. prasina* Thunb., mais le pronotum moins densément ponctué, l'écusson moins allongé, le dessous entièrement différent comme coloration, le sillon abdominal un peu plus étroit.

Tête finement pointillée; la ponctuation plus dense sur les côtés et en avant qu'au milieu; fossette frontale allongée. Pronotum plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'un fin pointillé plus dense sur les côtés que sur le disque, avec, de part et d'autre, une fossette transversale oblongue et un peu oblique; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés obliques en avant et droits en arrière avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian large et tronqué. Écusson très allongé. Élytres à ponctuation fine, dense et très régulière; les côtes avec l'allure de celles de toutes les espèces du genre, mais linéaires et peu saillantes; les épaules arrondies; les côtés atténués suivant une courbe régulière de la base au sommet, qui présente un très petit vide anguleux sutural limité de part et d'autre par une dent aiguë. Dessous sombre, couvert de vagues rides sinueuses; prosternum large, assez convexe en avant, plan en arrière; sillon abdominal large, bien limité sur le dernier segment abdominal seulement par deux carènes se prolongeant en pointe aiguë; une deuxième dent, sur les côtés du sommet du dernier segment abdominal.

Chrysobothris regina nov. sp. — *Allongé, atténué à l'extrémité, d'un vert obscur et très brillant en dessus; dessous vert sur les côtés, d'un pourpré éclatant au milieu et sur les fémurs antérieurs; tarses obscurs et bleuâtres.* — Long., 13; larg., 5,5 mill.

Queensland (Staudinger).

Du groupe des *Chr. Fabricii* Saund (*impressa* Cast. et Gory), *consanguinea* et *decolorata* Cast. et Gory, *sexpunctata* Fab., *Thomsoni* Waterh., de l'Amérique centrale et méridionale, etc., à lobe médian du pronotum avancé sur l'écusson et tronqué, et nécessitant une subdivision spéciale dans le genre *Chrysobothris*.

Tête plane, granuleuse, couverte d'une courte villosité blanche; épistome bisinué. Pronotum beaucoup plus large que haut, couvert d'une fine ponctuation rare sur le disque et dense sur les côtés; la marge antérieure tronquée; les côtés très obliques en avant et en arrière et arrondis au milieu avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base fortement bisinuée avec le lobe médian très avancé et tronqué. Écusson très petit. Élytres presque lisses, couverts d'une fine ponctuation régulièrement espacée, les taches vertes finement granuleuses; ils présentent de part et d'autre un sillon longeant la

suture et limité extérieurement par une côte atteignant à peine le tiers antérieur et prolongée postérieurement suivant une épine aiguë; de part et d'autre cinq fossettes : deux à la base, une au milieu du disque, vers le tiers antérieur, deux au tiers postérieur; les côtés fortement dentés du tiers postérieur au sommet. Dessous très brillant, à ponctuation excessivement fine et très espacée; dernier segment abdominal longitudinalement caréné au milieu et profondément échancré au sommet, l'échancrure limitée de part et d'autre par deux dents, l'interne petite, l'externe très longue et très aiguë, formant le prolongement d'une carène moins longue que la médiane.

Julodis Oberthuri nov. sp. — *Oblong ovale, assez convexe, d'un bronzé violacé obscur; les élytres garnis de nombreuses mouchetures ou fossettes disposées en séries longitudinales, garnies d'une pubescence brunâtre; la ponctuation du dessous garnie de la même pubescence.* — Long., 30; larg., 11 mill.

Kirghisie (R. Oberthür).

Du groupe des *Jul. euphratica* Cast. et Gory, *proxima* Gory et *iris* Cast. et Gory; plus étroit et plus svelte que la première de ces espèces; la fossette du pronotum plus nette et plus accentuée; les mouchetures élytrales moins nombreuses et partant plus espacées.

Tête plane, couverte de rides inégales convergeant vers une vague fossette frontale; vertex avec un très fin sillon médian. Pronotum convexe, un peu plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, avec des reliefs vermiculés dont les intervalles sont couverts d'une ponctuation excessivement fine; le disque avec une impression médiane allongée à la base et les côtés irrégulièrement déprimés le long de la marge latérale et à une certaine distance de celle-ci; la marge antérieure tronquée; les côtés obliques et faiblement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux. Élytres un peu plus larges que le pronotum à la base, couverts d'une grosse ponctuation irrégulièrement espacée et dont les intervalles forment des empâtements vermiculés, ornés de part et d'autre de quatre séries longitudinales de fossettes tomenteuses à fond finement granuleux et de fossettes plus petites et beaucoup plus irrégulières que les précédentes le long de la marge latérale postérieure. Dessous couvert de reliefs vermiculés dont les intervalles forment des espaces irréguliers, finement granuleux et couverts de poils couchés et roux; pattes médiocres, grossièrement ponctuées.

Stigmodera cincticollis nov. sp. — *Assez grand, allongé, oblong ovale; tête, écusson et pronotum vert métallique clair, la marge latérale du dernier rouge; élytres brun rouge avec les bords un*

peu plus clairs que le disque, la suture verte sur le disque, concolore en avant et en arrière. Dessous vert clair, brillant et métallique; épipleures prosternales et élytrales rouge vif. — Long., 27; larg., 10 mill.

Australie.

Assez voisin de *St. sanguinipennis* Cast. et Gory, mais le pronotum un peu plus élargi en avant, sa ponctuation plus épaisse et plus rugueuse, le sillon médian nul, remplacé par une ligne longitudinale lisse, caréniforme; l'extrémité des élytres arrondie et inerme; le dessous, sauf les épipleures prosternales, entièrement concolore.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum peu convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense, irrégulièrement espacée, avec une ligne longitudinale lisse au milieu du disque et deux points enfoncés situés un peu plus près de la ligne médiane que du bord extérieur et plus près de la marge antérieure que de la base; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et anguleux; les côtés très arqués avec l'angle postérieur droit; la base sinueuse sur les côtés et tronquée au milieu. Écusson petit, circulaire. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées, les interstries légèrement convexes, subcostiformes; le sommet conjointement arrondi et inerme. Dessous finement granuleux et régulièrement ponctué; prosternum convexe, presque lisse, sillonné de part et d'autre sur les côtés; pattes finement ponctuées.

Stigmodera æstimata nov. sp. — *Assez grand, oblong ovale; tête, écusson et pronotum noirs et brillants, élytres rouge brique, un peu plus clairs sur les bords que sur le disque, l'extrémité de la suture bleu foncé très brillant. Dessous vert foncé et brillant; pattes bleuâtres, fémurs et tarses bleus; épipleures élytrales et milieu des épipleures prosternales rouges.* — Long., 27; larg., 10 mill.

Australie.

Facies de *St. sanguinipennis* Cast. et Gory, mais le pronotum plus convexe, ses côtés plus dilatés au milieu et non bordés de rouge; une seule dent suturale à l'extrémité des élytres; le dessous, sauf les épipleures prosternales, entièrement concolore.

Tête finement et régulièrement ponctuée; couverte de poils d'un gris jaunâtre assez denses; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine et très dense; le disque sillonné longitudinalement au milieu; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés très arqués avec l'angle postérieur obtus; la marge latérale formant un bourrelet à la partie antérieure et médiane; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson très petit, subtriangulaire. Élytres couverts de stries

longitudinales finement pointillées, tronqués au sommet, la troncature faiblement échancrée avec une assez forte épine suturale. Dessous finement et régulièrement ponctué, couvert d'une villosité longue, molle et lâche, d'un jaune sale; prosternum plan; pattes à ponctuation fine et très espacée.

Stigmodera sincera nov. sp. — *Assez grand, oblong ovale; tête, écusson et pronotum vert métallique clair; élytres rouge brique avec une bande suturale d'un vert bleuâtre plus large au sommet et diminuant graduellement jusqu'au quart antérieur. Dessous vert doré, brillant; le milieu du dernier segment abdominal avec une large bande sinueuse d'un rouge vif; une petite tache de même sur les côtés de l'avant-dernier segment.* — Long., 27; larg., 10 mill.

Australie (Staudinger).

Assez voisine de *St. limbata* Don., mais le pronotum convexe, moins dilaté et moins rugueux, sans marge latérale rouge; l'écusson beaucoup plus petit; les élytres bidentés de part et d'autre à l'extrémité; le dessous un peu moins lisse.

Tête finement ponctuée, déprimée en avant, sillonnée au milieu et en arrière. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué avec une ligne longitudinale lisse au milieu du disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi; les côtés très obliques en avant, dilatés et arrondis au milieu, presque droits ensuite avec l'angle postérieur un peu abaissé; la base sinueuse avec une petite échancrure latérale pour l'insertion d'un petit lobe élytral et tronquée au milieu. Élytres couverts de stries longitudinales, les interstries avec un fin pointillé très espacé; le sommet échancré de part et d'autre, les échancrures limitées chacune par deux dents aiguës. Dessous finement et régulièrement ponctué et couvert d'une villosité molle, lâche, peu dense et d'un jaune sale; prosternum plan, presque lisse, sillonné sur les côtés; pattes faiblement ponctuées; extrémité du dernier segment abdominal ♂ bilobée et échancrée en arc au milieu.

Stigmodera cognata (Dej. mss.) nov. sp. — *Oblong, allongé, faiblement élargi au tiers postérieur; tête et pronotum bleus, élytres noirs avec trois taches transversales ocrées, la première envahissant toute la base sauf la région scutellaire, la deuxième oblique et sinueuse, interrompue à la suture, la troisième préapicale, interrompue à la suture et prolongée le long du bord. Dessous d'un bleu violacé très brillant.* — Long., 17; larg., 6 mill.

Australie (Dejean par Chevrolat).

Facies de *St. erythromelas* Boisd., mais le dessin élytral tout diffé-

rent, le pronotum beaucoup moins large, ses côtés moins dilatés, l'extrémité des élytres arrondie et inerme.

Tête ponctuée; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum peu convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine et régulière avec une vague ligne longitudinale médiane lisse; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés obliques en avant et arrondis après le milieu; la base bisinuée avec un large lobe médian peu arqué. Écusson triangulaire. Élytres couverts de stries longitudinales finement pointillées, les interstries très pointillées sur la région latérale, moins sur la région suturale; le sommet subacuminé et inerme. Dessous très finement ponctué; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera speciosa nov. sp. — *Oblong, légèrement élargi au tiers supérieur; tête, écusson et pronotum d'un vert doré clair et très brillant; élytres rouges avec la suture, une tache allongée humérale, une tache arrondie postscutellaire commune aux deux élytres et une tache arquée préapicale, également commune aux deux élytres, le tout d'un vert métallique clair. Dessous vert métallique; les trois derniers segments abdominaux teintés de fauve rougeâtre.* — Long., 17; larg., 6,5 mill.

Australie.

Forme générale de *St. Castelnaudi* Saund., mais moins convexe, le pronotum moins élargi, ses bords concolores et moins dilatés; les deux dents apicales de chaque élytre mieux accentuées

Tête finement et régulièrement ponctuée, déprimée dans toute sa longueur, la dépression triangulaire, plus large en avant qu'en arrière. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation plus dense et plus épaisse sur les côtés que sur le disque; une petite fossette médiane près de la base, au dessus de l'écusson; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés très obliques en avant et arrondis au delà du milieu avec l'angle postérieur très légèrement saillant en dehors, petit, aigu et un peu abaissé sur l'épaule; la base tronquée sur les côtés avec un large lobe médian faiblement arqué. Écusson petit, pentagonal, allongé, acuminé au sommet. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées avec les interstries peu saillants et lisses; le sommet avec une très petite échancrure interne, oblique, bidentée de part et d'autre. Dessous finement et régulièrement ponctué; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera triangulosa nov. sp. — *Tête et pronotum noir verdâtre, le dernier bordé de fauve rougeâtre; élytres fauve rougeâtre*

avec un très grand triangle scutellaire dont le sommet atteint le tiers supérieur, une bande transversale sinueuse et préapicale, souvent interrompue vers la suture et l'apex, le tout d'un noir verdâtre. Dessous vert clair et brillant; épipleures prosternales largement bordées de fauve rougeâtre. — Long., 15 ; larg., 5,5 mill.

Australie (Staudinger).

Voisin de *St. cyanipes* Saund., mais un peu moins robuste, le pronotum beaucoup plus gibbeux, ses côtés plus dilatés au milieu ; le dessin élytral différent, la tache triangulaire beaucoup plus allongée.

Tête finement ponctuée, profondément excavée et sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière ; couvert d'une ponctuation très dense, le milieu du disque longitudinalement et vaguement sillonné, le sillon plus net en arrière et terminé par une fossette préscutellaire ; la marge antérieure échancrée en arc; les côtés très obliques en avant, dilatés et arrondis au delà du milieu avec l'angle postérieur très abaissé et aigu; la base très onduleuse. Écusson subcordiforme. Élytres couverts de stries longitudinales et ponctuées, les interstries plans et criblés de points fins, surtout sur la région extérieure ; le sommet finement dentelé. Dessous ponctué, couvert d'une très courte villosité blanchâtre ; prosternum large, aplani, sillonné sur les côtés ; pattes finement ponctuées.

Stigmodera cupida nov. sp. — *Subcylindrique, les côtés parallèles, les extrémités arrondies; tête et le pronotum vert doré très légèrement bronzé, les côtés du dernier bordés de rouge; élytres rouges ou rouge orangé avec la suture, une tache allongée humérale, une bande transversale au tiers supérieur et une tache semi-circulaire préapicale, le tout d'un vert bleuâtre brillant. Dessous entièrement vert doré clair, sauf les épipleures prosternales, qui sont d'un rouge orangé.* — Long., 14 ; larg., 5,3 mill.

Australie (Staudinger).

Facies de *St. anchoralis* Cast. et Gory, le dessin élytral à peu près semblable, mais la coloration générale différente ; le pronotum plus convexe, l'armature terminale des élytres autrement disposée.

Tête ponctuée, déprimée en avant et sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum très convexe, plus large que haut, semicirculaire, finement et régulièrement ponctué, avec un vague sillon longitudinal lisse au milieu du disque ; la marge antérieure presque droite; les côtés très arqués en avant et droits après le milieu avec l'angle postérieur un peu abaissé ; la base sinueuse. Écusson allongé, subpentagonal. Élytres convexes, couverts de stries longitudinales et ponctuées, les interstries granuleux, finement ponctués; le

sommet largement arrondi, peu obliquement tronqué près de la suture avec une très petite dent apicale. Dessous finement et régulièrement ponctué; prosternum légèrement convexe, sillonné sur les côtés; l'abdomen garni d'une courte villosité blanche.

Stigmodera campestris nov. sp. — *Oblong, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum bleu foncé, le second latéralement bordé de fauve; élytres d'un vert brillant et obscur avec une bande médiane transversale dont un rameau latéral remonte jusqu'à la base du pronotum et une bande transversale préapicale flexueuse dont un rameau latéral descend jusqu'au sommet de l'élytre, le tout d'un fauve rougeâtre. Dessous d'un bleu violacé obscur; marge des épipleures prosternales largement teintée de fauve rougeâtre.* — Long., 11,2; larg., 4,5 mill.

Australie (Staudinger).

Très voisin de *St. grata* Saund., mais un peu plus large au tiers supérieur; les élytres obliquement tronqués à l'épaule ainsi qu'au sommet, où ils forment un très petit vide anguleux sutural; la bande latérale fauve remontant jusque contre le pronotum; celle du sommet étroite, flexueuse et bordant toute l'extrémité, du tiers supérieur à l'extrémité.

Tête creusée et ponctuée. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation régulièrement espacée; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés dilatés et très arqués avec l'angle postérieur obtus; la base subsinueuse. Écusson allongé, déprimé et subpentagonal. Élytres convexes, couverts de stries linéaires, les interstries plans et pointillés; le sommet très finement denticulé, avec une petite troncature oblique et suturale. Dessous finement ponctué; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera observans nov. sp. — *Oblong, très légèrement élargi au tiers supérieur, arrondi à l'extrémité; tête et pronotum d'un bronzé verdâtre et brillant; élytres jaune orangé obscur avec une très étroite bande marginale antérieure et la région suturale d'un bleu verdâtre brillant et obscur; le calus huméral parfois teinté de même. Dessous bronzé verdâtre très obscur et brillant.* — Long., 14; larg., 5 mill.

Australie.

Taille et facies de *St. Jekeli* Saund., mais différent de celui-ci quant au dessin élytral.

Tête ponctuée et faiblement déprimée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, assez densément et régulièrement ponctué avec une ligne longitudinale lisse au-dessus de l'écusson; la marge antérieure à peine

sinueuse avec le lobe médian peu avancé et subanguleux; les côtés assez arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et droit; la base bisinuée avec le lobe médian arrondi. Écusson subcordiforme et déprimé. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans et finement pointillés; le sommet conjointement arrondi avec un très petit vide anguleux sutural. Dessous finement ponctué et couvert d'une villosité couchée, peu dense et d'un gris jaunâtre; prosternum plan, sillonné de part et d'autre sur les côtés.

Stigmodera agrestis nov. sp. — *Oblong, peu convexe, tête et pronotum cuivreux pourpré; élytres violacés avec, de part et d'autre, des bandes jaune clair formant : une étroite ligne humérale contre le bord extérieur, allant de la base jusqu'un peu au delà de la marge inférieure du premier segment abdominal; une ligne droite, discale, parallèle à la suture et réunie à l'humérale par un petit trait horizontal; une bande très arquée, longeant le bord extérieur à l'apex, entourant entièrement celui-ci. Dessous noirâtre, à légers reflets irisés, couvert d'une villosité blanchâtre.* — Long., 9; larg., 3 mill.

Queensland.

Voisin de *St. costata* Saund., le dessin de la bande jaune du sommet des élytres à peu près sembable, mais celui de la partie antérieure très différent; la coloration tout autre.

Tête finement ponctuée; front faiblement sillonné; le sillon limité par une vague fossette postérieure. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation, dense et régulièrement espacée, avec une vague ligne longitudinale et médiane lisse et trois vagues fossettes le long de la base, la première au-dessus de l'écusson, les deux autres près de chacun des angles inférieurs; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés obliquement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson très petit, subtriangulaire et finement granuleux. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries peu convexes et très finement granuleux; le sommet échancré, l'échancrure limitée extérieurement, de part et d'autre, par une dent obtuse; la dent suturale à peine apparente. Dessous finement ponctué et couvert d'un duvet argenté, dense et très court; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera Fairmairei nov. sp. — *Oblong, peu convexe; tête et pronotum d'un violacé métallique obscur; élytres d'un noir bleuâtre brillant avec deux bandes transversales ocrées, interrompues à la suture. Dessous vert métallique obscur.* — Long., 17; larg., 6,5 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Très voisin de *St. cupricollis* Saund., surtout vu en dessus, sauf l'absence de la tache humérale fauve; la bande médiane un peu plus

large et située un peu plus haut, la préapicale moins sinueuse; la coloration du dessous est entièrement différente.

Tête ponctuée, largement excavée, l'excavation lancéolée en arrière. Pronotum ponctué, assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné vaguement au milieu du disque; la marge antérieure médiocrement échancrée en arc; les côtés très obliques en avant, arrondis et dilatés après le milieu avec l'angle postérieur obtus; la base faiblement bisinuée. Écusson subcordiforme, déprimé longitudinalement. Élytres peu convexes, déprimés de part et d'autre à la base, couverts de stries ponctuées, les interstries peu saillants; les côtés postérieurs et le sommet finement dentelés en scie; ce dernier séparément arrondi. Dessous finement ponctué, couvert d'une très courte pubescence grise; prosternum large, plan et sillonné sur les côtés; pattes faiblement ponctuées.

Stigmodera affabilis nov. sp. — *Oblong, assez convexe, arrondi aux extrémités; tête et pronotum d'un bronzé verdâtre; élytres jaunes avec deux bandes transversales et une tache apicale bleues réunies à la suture; celle-ci verdâtre. Dessous bleu foncé.* — Long., 12; larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Facies de *St. Hoffmannseggi* Hope, mais moins robuste; les bandes élytrales bleues disposées de même, mais de moitié plus étroites.

Tête finement ponctuée; front déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez forte, très dense et régulièrement espacée; la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés obliquement arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson cordiforme et déprimé. Élytres couverts de stries assez profondes, grossièrement et régulièrement ponctuées; les interstries finement pointillés, plans en avant et légèrement convexes en arrière; le sommet échancré de part et d'autre, l'échancrure limitée par deux dents aiguës. Dessous finement ponctué et couvert d'une très courte vestiture grisâtre; prosternum plan, assez large, sillonné sur les côtés.

Stigmodera colorata nov. sp. — *Oblong ovale, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum noirs; élytres d'un vert brillant avec une étroite bande marginale rouge à l'épaule, descendant jusqu'un peu au delà des hanches postérieures, et une bande transversale préapicale, de même nuance, interrompue à la suture et s'élargissant un peu sur les côtés vers le sommet. Dessous bleu verdâtre, très brillant.* — Long., 15; larg., 5,5 mill.

Australie.

Espèce assez voisine de *St. Thomsoni* Saund., quant à la forme

générale du corps, mais tout à fait distincte de celle-ci par la coloration et la disposition des bandes rouges.

Tête finement ponctuée; front déprimé. Pronotum convexe, finement et régulièrement ponctué, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, la base impressionnée au-dessus de l'écusson; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés obliquement et régulièrement arqués avec l'angle postérieur aigu; la base subsinueuse. Écusson subcordiforme et déprimé. Élytres couverts de stries longitudinales assez profondes, les interstries légèrement saillants et couverts d'un fin pointillé, très épars et irrégulièrement espacé; le sommet échancré à la suture avec une dent, de part et d'autre, assez forte et limitant extérieurement l'échancrure. Dessous ponctué, couvert d'une villosité grisâtre; prosternum large, ponctué, à peine sillonné sur les côtés; pattes faiblement ponctuées.

Stigmodera felix nov. sp. — *Oblong ovale, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum noirs à légers reflets irisés; élytres jaune orangé avec deux bandes transversales et une tache cordiforme préapicale bleu foncé. Dessous bronzé obscur à reflets irisés; pattes bleues.* — Long., 13; larg., 5 mill.

Australie.

Facies de *St. delectabilis* Hope, mais un peu plus robuste, la coloration générale différente, les bandes élytrales disposées à peu près de même, mais plus régulières.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front sillonné avec une fossette médiane. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation un peu plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure à peine échancrée en arc; les côtés obliquement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson subcordiforme, déprimé le long de la base. Élytres couverts de stries profondes et ponctuées; les interstries plans et finement pointillés; le sommet faiblement échancré à la suture. Dessous finement ponctué, couvert d'une courte villosité grise; prosternum large, tronqué au sommet.

Stigmodera acuminata nov. sp. — *Étroit, allongé, peu convexe, très acuminé au sommet; tête et pronotum d'un vert sombre excessivement brillant à reflets dorés; écusson vert clair; élytres vert brillant et obscur avec, de part et d'autre, une tache basilaire allongée, arquée, jaune, partant de l'angle huméral et atteignant le tiers antérieur, une seconde tache oblique, transversale, jaune, située vers le milieu et une tache arquée jaune, préapicale, passant au rouge vif sur le bord extérieur. Dessous vert métallique clair et très brillant; pattes bleues.* — Long., 14; larg., 4 mill.

Nouvelle-Galles du Sud (Staudinger).

Plus étroite et beaucoup plus acuminée au sommet que *St. producta* Saund., cette espèce a la tête relativement plus forte, le pronotum plus étroit, moins convexe, ses côtés plus arqués, le sillon médian nul, remplacé par une fossette préscutellaire.

Tête finement ponctuée; front étroit, déprimé longitudinalement. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'un fin pointillé très espacé; trois fossettes le long de la base : deux nettes, dans chacun des angles, postérieurs, une, vague, au-dessus de l'écusson; la marge antérieure tronquée; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la base. Élytres couverts de séries longitudinales de points, les interstries 2, 4 et 6 relevés en côtes; le sommet très acuminé et formant, à la suture, un vide anguleux allongé, très aigu. Dessous finement ponctué; prosternum large, plan, arrondi à l'extrémité; métasternum saillant, plus élevé que le prosternum et formant un plan oblique par rapport à celui de l'abdomen.

Stigmodera placens nov. sp. — *Oblong, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum violacé pourpré; élytres jaunes avec l'extrémité, la suture et deux bandes transversales noir bronzé très brillant et situées : la première près de la base, ne laissant le long de celle-ci qu'une étroite bande jaune; la deuxième au tiers supérieur. Dessous violacé pourpré à reflets cuivreux; abdomen fauve à reflets irisés; pattes violacées.* — Long., 15; larg., 5 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Voisine des *St. rectifasciata* Saund. et *colligens* Kerr., mais un peu plus convexe et plus étroite, cette espèce a les bandes élytrales disposées à peu près de même.

Tête finement ponctuée; front déprimé longitudinalement. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense et plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure tronquée; les côtés très obliques en avant, arrondis après le milieu avec l'angle postérieur un peu abaissé et obtus; la base bisinuée. Écusson subpentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries larges et peu saillants, très finement ridés; le sommet à peine denté avec une très petite troncature suturale et oblique. Dessous finement ponctué, couvert d'une très courte villosité grise; prosternum large, plan, sillonné de part et d'autre sur les côtés.

Stigmodera vigilans nov. sp. — *Oblong ovale, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum noirs; élytres bleus ou violacés, obscurs et brillants avec trois bandes jaunes interrompues à la suture;*

la première longeant la base et descendant le long des épipleures; la deuxième, médiane, très légèrement sinueuse; la troisième arquée. Dessous bleu, parfois à reflets violacés. — Long., 10-12; larg., 3,5-4 mill.

Victoria (Staudinger).

Très voisine de *bicincta* Boisd., quant au facies et à la structure élytrale; s'en distingue surtout par la bande basilaire des élytres, par la bande médiane interrompue à la suture et située plus bas, par la bande préapicale située également plus bas, plus large et moins arquée, enfin par l'armature terminale des élytres, entièrement différente.

Tête ponctuée; front sillonné. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué, la ponctuation plus dense et plus épaisse sur les côtés que sur le disque; le long de la base, trois vagues fossettes, l'une médiane, les deux autres latérales, près de l'angle inférieur; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés obliquement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson petit, subcordiforme. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries convexes, surtout sur les côtés; le sommet échancré à la suture. Dessous finement ponctué, couvert d'une courte villosité blanchâtre; prosternum large, plan, arrondi au sommet.

Stigmodera baliola nov. sp. — *Assez large, écourté; tête bleue, pronotum noir, brillant et légèrement bronzé; élytres avec la moitié antérieure jaune, sauf une étroite bande marginale antérieure bleu foncé et s'étendant sur le calus huméral, la moitié postérieure bleu foncé avec une bande préapicale arquée jaune et interrompue à la suture. Dessous bleu et brillant à reflets pourprés.* — Long., 11; larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Ressemble, pour la forme générale du corps, aux *St. vicina* Saund. et *obsepta* Kerr.; s'en distingue surtout par la moitié antérieure jaune des élytres.

Tête ponctuée; front étroit, creusé en avant; une fossette en arrière. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation assez espacée, la marge antérieure échancrée en arc; les côtés obliques et faiblement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson cordiforme. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans en avant et convexes en arrière; le sommet échancré avec, de part et d'autre, une dent externe et une suturale. Dessous finement ponctué; prosternum large, sillonné sur les côtés, tronqué au sommet; métaster-

num saillant, très échancré en avant, oblique par rapport au plan de l'abdomen.

Stigmodera uniformis nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum bronzé verdâtre clair et très brillant; élytres d'un fauve orangé avec une bande transversale au tiers supérieur et une tache subcordiforme apicale, commune aux deux élytres, noires. Dessous vert glauque obscur; pattes bleues.* — Long., 13,5; larg., 5 mill.

Australie (Staudinger).

Facies de *St. delectabilis* Hope, mais un peu moins convexe, plus élargi au tiers supérieur, la bande antérieure noire des élytres absente, celle du tiers postérieur plus anguleuse, simulant trois losanges placés l'un à côté de l'autre et dont les deux externes seraient coupés dans leur moitié: la tache apicale plus grande et remontant plus haut.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front déprimé. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine et régulièrement espacée ; la marge antérieure à peine échancrée; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson subpentagonal, déprimé au milieu. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries un peu saillants; le sommet avec de part et d'autre une petite échancrure suturale limitée par deux petites dents. Dessous finement ponctué, couvert d'une courte villosité grisâtre; prosternum sillonné sur les côtés postérieurs.

Stigmodera deliciosa nov. sp. — *Assez large, subovalaire, peu convexe; tête et pronotum bronzé obscur et très brillants; élytres jaune fauve orangé avec une bande transversale et préapicale violacée et une tache apicale triangulaire, commune aux deux élytres et rejoignant la précédente à son sommet. Dessous bleu et brillant.* — Long., 10; larg. 4,8 mill.

Australie.

Se rapproche de *St. vicina* Saund., par la forme générale, mais entièrement différent de celui-ci par le système de coloration.

Tête ponctuée et creusée, sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, espacée et un peu plus épaisse sur les côtés que sur le disque; trois vagues fossettes situées: deux en avant, au milieu du disque, un peu plus près du bord antérieur que de la base; la troisième contre la base, immédiatement au-dessus de l'écusson; la marge antérieure à peine échancrée; les côtés obliques et régulièrement arqués avec l'angle postérieur

abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux. Écusson cordiforme, déprimé. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans sur le disque et légèrement costiformes au sommet; celui-ci obliquement échancré de part et d'autre, les échancrures limitées par une petite dent suturale et une dent externe plus accentuée. Dessous finement ponctué et couvert d'une fine pubescence grise; prosternum large, tronqué à l'extrémité; métasternum saillant, très échancré en avant, et formant un plan oblique par rapport à l'abdomen.

Stigmodera laudabilis nov. sp. — *Oblong ovale, allongé, à peine élargi au tiers supérieur; tête et pronotum noirs, brillants et légèrement irisés, les côtés du second verdâtres; élytres rouge brique avec la suture, une bande transversale au tiers supérieur et une tache subrectangulaire apicale bleu foncé. Dessous bleu.* — Long., 9,5; larg., 3 mill.

Australie.

Beaucoup plus allongée et plus étroite que *St. deliciosa* qui précède; le dessin élytral à peu près semblable comme allure générale.

Tête densément ponctuée, légèrement déprimée et sillonnée longitudinalement. Prosternum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense et assez épaisse sur les côtes, moins accentuée sur le disque; la marge antérieure tronquée; les côtés obliquement arqués avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base à peine bisinuée. Écusson pentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans en avant et un peu saillants en arrière; le sommet obliquement échancré de part et d'autre, les échancrures limitées par une petite dent suturale et une large dent externe. Dessous assez densément ponctué, couvert d'une courte villosité grisâtre; prosternum et métasternum situés sur un même plan; le premier un peu convexe et sillonné sur les côtés.

Stigmodera verax nov. sp. — *Oblong ovale, légèrement élargi au tiers supérieur; tête obscure, bleuâtre; pronotum noir verdâtre et très brillant; écusson bleu; élytres jaunes avec une tache irrégulière bleu foncé, plus ou moins grande autour de l'écusson, la région postérieure bleu foncé avec une bande arquée jaune, interrompue à la suture. Dessous bleu foncé et brillant.* — Long., 11; larg., 4 mill.

Cocktown (Staudinger).

Du groupe de *St. Andersoni* Cast. et Gory, mais avec la nuance bleue de la région supérieure des élytres remontant plus haut et la bande préapicale bleue plus étroite et ne s'étendant pas le long du bord vers le sommet.

Tête finement ponctuée; front largement déprimé en avant. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine et régulièrement espacée, plus dense et plus épaisse sur les côtés postérieurs; la marge antérieure tronquée; les côtés obliques et faiblement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux. Écusson cordiforme et transversal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans en avant et légèrement convexes en arrière; le sommet tronqué, la troncature large, un peu oblique et limitée de part et d'autre par deux dents aiguës. Dessous régulièrement ponctué; prosternum large; métasternum très échancré en avant, médiocrement relevé.

Stigmodera timida nov. sp. — *Oblong ovale, peu convexe, légèrement élargi au tiers supérieur; tête et pronotum verts, le disque du second cuivreux obscur; élytres violacé pourpré et brillants avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la première contre la base, à égale distance de la suture et du bord extérieur; la deuxième, humérale, semi-lunaire, contre la marge latérale; la troisième, transversale, un peu arquée, traversant le milieu du disque du bord extérieur à la suture, sans toucher cette dernière; la quatrième, préapicale, arquée, comme la précédente, mais dirigée en sens contraire. Dessous bleu verdâtre clair, couvert d'une villosité blanche.* — Long., 10; larg., 3,5. mill.

Adelaïde (L. Fairmaire).

Plus petit et moins robuste que *St. australasiæ* Cast. et Gory; les macules jaunes des élytres à peu près semblables, mais relativement plus larges; les interstries élytraux plus plans, la coloration générale du dessus différente, celle du dessous un peu plus pâle.

Tête finement ponctuée; front déprimé longitudinalement, la dépression limitée en arrière par une fossette. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation régulièrement espacée avec une très vague ligne médiane lisse, plus accentuée vers la base qu'au sommet; la marge antérieure subtronquée, à peine sinueuse; les côtés arqués; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi. Écusson petit, triangulaire et lisse. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries subconvexes et finement granuleux; le sommet avec une très petite échancrure suturale oblique limitée de part et d'autre par deux petites dents. Dessous finement ponctué et couvert d'une courte villosité grisâtre; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera puerilis nov. sp. — *Oblong, subcylindrique; tête et pronotum bronzé verdâtre et brillant; élytres bleu foncé légèrement*

violacé avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la première, subarrondie, contre la base, à égale distance des bords; la deuxième, allongée, contre la marge latérale à l'épaule et séparée de la précédente par un étroit calus huméral; la troisième, transversale, faiblement arquée, médiane, allant du bord extérieur à la suture sans toucher celle-ci; la quatrième, préapicale et transversale, à peine arquée. Dessous très brillant, bleu foncé; les segments abdominaux verdâtres. — Long., 10; larg., 3,3 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Très voisin de *St. timida*, qui précède, mais plus cylindrique, plus étroit; les côtés moins sinueux et non dilatés au tiers supérieur, les macules élytrales disposées de même, mais moins arquées; le dessous différent.

Tête finement et régulièrement ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et régulièrement espacée, avec une ligne médiane lisse, nette mais très étroite; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés arqués avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué et subéchancré au dessus de l'écusson. Écusson déprimé et triangulaire. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries un peu convexes et finement granuleux; le sommet à peine échancré, l'échancrure étroite, oblique et limitée de part et d'autre par deux très petites dents, la suturale moins accentuée que l'externe. Dessous brillant, très finement et régulièrement pointillé, à peine pubescent; la pubescence excessivement courte; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera sensitiva nov. sp. — *Oblong, allongé, assez étroit; tête et pronotum vert sombre à reflets pourprés, le second avec la marge latérale jaune; élytres noirâtres, légèrement violacés avec la suture verdâtre et claire et, de part et d'autre, cinq macules jaunes : la première, à la base, arrondie et petite, plus près de la suture que du bord extérieur; la deuxième, allongée, contre le bord extérieur et longeant le métasternum; la troisième, transversale, un peu arquée et oblique, partant du bord à hauteur du milieu du premier segment abdominal et remontant sans atteindre la suture; la quatrième, transversale, arquée en sens contraire, située au tiers postérieur et un peu moins longue que la précédente; la cinquième, enfin, très petite, punctiforme, dans l'angle apical. Dessous vert obscur à reflets pourprés.* — Long., 12; larg., 4 mill.

Australie.

Espèce voisine des *St. violacea* Mac Leay et *australasiæ* Cast. et Gory, mais un peu plus étroite; la disposition des taches élytrales à peu près semblable, les bords du pronotum jaunes.

Tête finement ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur; front déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, finement et régulièrement ponctué; la marge antérieure à peine échancrée en arc; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson subpentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries subplans et finement pointillés; le sommet finement crénelé sur les côtés et unidenté de part et d'autre à l'extrémité avec une très petite échancrure apicale. Dessous finement ponctué et couvert d'une villosité grisâtre, peu dense et très courte.

Stigmodera consularis nov. sp. — *Oblong ovale, légèrement élargi au tiers supérieur; tête obscure, verdâtre; pronotum orangé avec une large bande transversale oblongue noire envoyant vers l'écusson un lobe triangulaire; élytres jaunes avec, de part et d'autre, une grande tache humérale, trois taches arrondies situées en ligne droite à hauteur du tiers postérieur et dont la médiane est commune aux deux élytres, et enfin une tache apicale subcordiforme, également commune aux deux élytres, le tout d'un vert obscur et brillant. Dessous noir bleuâtre; épipleures prosternales jaune orangé.* — Long., 10; larg., 3 mill.

Queensland.

Aspect général de *St. mustelamajor* Ths., mais un peu plus robuste, plus convexe, moins acuminé au sommet et le dessin élytral différent.

Tête finement ponctuée; front déprimé et sillonné. Pronotum très convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation très dense et très régulière; la marge antérieure faiblement échancrée en arc; les côtés obliquement arqués et sinueux en arrière avec l'angle postérieur abaissé et très acuminé; la base bisinuée avec le lobe médian arqué. Écusson subtriangulaire, la base légèrement échancrée en arc, les côtés arqués. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries un peu saillants et finement pointillés; le sommet avec, de part et d'autre, une petite échancrure suturale oblique; les échancrures limitées par une dent suturale interne un peu moins forte que l'externe. Dessous irrégulièrement ponctué, couvert d'une courte vestiture grise, très dense; prosternum large, sillonné sur les côtés; métasternum plan.

Stigmodera addenda nov. sp. — *Oblong, assez convexe; tête, pronotum, sternum et pattes pourpré violacé métallique; élytres et abdomen d'un jaune fauve.* — Long., 11; larg., 4,5 mill.

Australie.

Voisin de *St. ochreiventris* Saund., mais le pronotum plus

rugueux, les interstries élytraux plus élevés. Se rapproche également de *St. flava* Saund., mais le pronotum relativement plus large, l'extrémité des élytres avec une petite échancrure terminale bidentée.

Tête ponctuée, creusée dans toute sa longueur. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez épaisse et très dense, surtout sur les côtés, où les intervalles forment des empâtements vermiculés; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arrondis après le milieu avec l'angle postérieur très petit, aigu et légèrement saillant en dehors; la base à peine bisinuée. Écusson allongé, lisse, subpentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries un peu convexes; le sommet bidenté de part et d'autre, les dents petites, peu aiguës et limitant une faible échancrure suturale et oblique. Dessous grossièrement et irrégulièrement ponctué sur le sternum et les hanches postérieures, finement et densément sur l'abdomen; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera unica nov. sp. — *Oblong, allongé; tête, pronotum et sternum d'un violacé pourpré obscur; élytres et abdomen d'un jaune fauve, les premiers avec une bande large suturale, irrégulière, s'élargissant à l'apex en forme de cœur et, de part et d'autre, une tache allongée humérale et une petite tache irrégulière située contre la marge extérieure à hauteur du tiers supérieur, le tout noir.* — Long., 12,5; larg., 4,3 mill.

Sidney.

Taille et facies de *St. auricollis* Thoms., la coloration générale plus sombre, les côtés des élytres moins dilatés.

Tête ponctuée et concave; front sillonné. Pronotum peu convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, régulière, un peu plus épaisse sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian anguleux; les côtés très arqués; la base faiblement bisinuée. Écusson allongé, subpentagonal. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées, les interstries légèrement granuleux sur la partie extérieure; le sommet obliquement et faiblement échancré de part et d'autre, l'échancrure limitée par deux petites dents. Dessous finement et régulièrement ponctué, la ponctuation un peu plus épaisse en avant qu'en arrière; prosternum plan, sillonné de part et d'autre.

Stigmodera generosa nov. sp. — *Allongé, elliptique, médiocrement convexe, tête et pronotum noirs, brillants, légèrement verdâtres; élytres jaune orangé avec une bande transversale au tiers antérieur, souvent interrompue de façon à former trois macules irré-*

gulières, une bande transversale postmédiane et une tache subcordiforme apicale, le tout bleu d'acier. Dessous noir à légers reflets métalliques; pattes bleues et obscures. — Long., 9,5; larg., 3,6 mill.

Australie.

Très voisin de *St. cyanicollis* Boisdv., mais moins parallèle et moins cylindrique; les interstries élytraux finement granuleux; l'apex bleu.

Tête creusée, assez grossièrement et régulièrement ponctuée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points assez gros, denses, plus gros sur le côté que sur le disque; la marge antérieure échancrée en arc; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur petit, légèrement saillant en dehors, un peu abaissé et aigu; la base bisinuée. Écusson déprimé, cordiforme. Élytres couverts de séries longitudinales de points, les interstries finement pointillés le long de la suture, granuleux et couverts de petites rides transversales le long des côtés extérieurs; le sommet avec une échancrure interne oblique et arquée limitée de part et d'autre par une dent suturale et une dent apicale, la première un peu moins accentuée que la seconde; les côtés postérieurs faiblement dentelés. Dessous ponctué; la ponctuation fine et régulière sur l'abdomen, grossière et inégale sur le sternum; prosternum sillonné sur les côtés.

Stigmodera confinis nov. sp. — *Oblong, allongé, peu convexe; tête et pronotum noir verdâtre; élytres bleu foncé à reflets violacés avec, de part et d'autre, à la base, deux macules jaunes, l'une, humérale, elliptique, contre le bord extérieur; l'autre, discale, triangulaire, séparée de la première par le calus huméral, au milieu de la base; deux petits points jaunes, situés l'un en dessous de l'autre, entre la quatrième et la cinquième strie. Dessous brillant, vert obscur.* — Long., 10; larg., 3,5 mill.

Queensland (Staudinger).

Facies de *St. sanguinolenta* Cast. et Gory, mais entièrement différent quant à la coloration; sa forme le rapproche de *St. ocelligera* Gory.

Tête ponctuée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et régulière; la marge antérieure tronquée; les côtés très arqués avec l'angle postérieur un peu abaissé et obtus; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué au-dessus de l'écusson. Celui-ci subcordiforme. Élytres couverts de stries ponctuées assez profondes; les interstries plans sur le disque, subconvexes sur les côtés et vers le sommet; celui-ci avec une faible

échancrure suturale oblique et bidenté de part et d'autre, la dent interne à peine sensible, l'externe un peu plus saillante. Dessous finement pointillé et couvert d'une très courte villosité grise; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera prudens nov. sp. — *Oblong, peu convexe, d'un beau vert émeraude avec le milieu des élytres bleuâtre, leur marge antérieure et les côtés bordés de rouge, la bordure interrompue à hauteur du premier segment abdominal, formant lunule autour de la région apicale.* — Long., 8-10; larg., 2,5-3,5 mill.

Queensland.

Forme générale de *St. confinis* qui précède, mais entièrement différent quant à la coloration et au dessin élytral; se rapproche, par le facies, de *St. ocelligera* Gory.

Tête ponctuée; front sillonné, le sillon limité en arrière par une vague fossette. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, fine et régulière, semblable à celle de la tête, et présentant un sillon médian linéaire; la marge antérieure tronquée; les côtés arqués en avant et presque droits en arrière; la base bisinuée. Écusson petit, subtriangulaire et déprimé. Élytres couverts de stries profondes et ponctuées; les interstries convexes et finement granuleux; le sommet obliquement et étroitement tronqué, à peine bidenté de part et d'autre. Dessous finement pointillé et à peine villeux; prosternum plan, sillonné de part et d'autre.

Stigmodera bucolica nov. sp. — *Allongé, peu convexe, atténué à l'extrémité; tête verte; pronotum vert, un peu plus obscur sur le disque que sur les côtés; élytres jaunes avec deux bandes transversales et une tache cordiforme apicale vertes. Dessous vert doré et brillant.* — Long., 10,5; larg., 3,7 mill.

Australie.

Moins robuste, moins convexe, plus étroit et plus acuminé au sommet que *St. cylindracea* Saund., dont il se rapproche par la disposition des bandes élytrales.

Tête ponctuée; front sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense, plus épaisse sur les côtés que sur le disque, le milieu de ce dernier avec une très vague ligne longitudinale lisse; la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés arqués avant le milieu, peu sinueux ensuite avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian étroit et tronqué. Écusson en triangle curviligne. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries plans; le sommet avec une très petite échancrure suturale oblique. Dessous finement et régulièrement ponctué; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera tacita nov. sp. — *Allongé, elliptique, subcylindrique, d'un vert brillant légèrement bleuâtre; les élytres jaunes avec deux bandes transversales et une tache apicale d'un bleu verdâtre, la bande antérieure ne touchant pas les bords extérieurs, droite en arrière et cintrée en avant; la bande postérieure touchant la marge latérale, le milieu formant losange; la tache apicale triangulaire et réunie à la bande postmédiane par une petite bande suturale; l'apex bleu.* — Long., 13; larg., 4,5 mill.

Australie.

Voisin de *St. Kirbyi* Guér., mais relativement plus étroit, le dessin du sommet de l'élytre autrement disposé; voisin également de *St. trifasciata* Cast. et Gory, mais plus cylindrique et moins élargi.

Tête finement ponctuée, faiblement déprimée et sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum convexe, plus large que haut, finement et régulièrement ponctué; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian à peine avancé et subanguleux; les côtés assez fortement et régulièrement arqués avec l'angle postérieur très petit, légèrement saillant en dehors et obtus; la base bisinuée avec le lobe médian large et peu arqué. Écusson subcordiforme et déprimé. Élytres convexes, couverts de séries longitudinales de points légèrement transversaux, les interstries peu convexes; le sommet à peine obliquement échancré intérieurement, la dent suturale très peu visible, l'externe un peu plus forte. Dessous finement et régulièrement ponctué; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera laetabilis nov. sp. — *Oblong, étroit, allongé, peu convexe; tête et pronotum pourpré obscur; élytres violets avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la première, allongée, un peu oblique, au milieu de la base; la deuxième, marginale, allongée, le long de l'épipleure; la troisième, subovalaire, transversale et un peu oblique, au milieu du disque; la quatrième, transversale, un peu arquée, au milieu du tiers supérieur. Dessous jaune, sauf les pattes, le métasternum, le bord des hanches postérieures et ceux des segments abdominaux qui sont d'un pourpré métallique.* — Long., 8; larg., 2,5 mill.

Australie.

Plus petit et plus étroit que *St. picta* Cast. et Gory, la bordure jaune du pronotum absente, les macules élytrales moins nombreuses et plus étroites.

Tête ponctuée; front étroitement sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, fine et régulièrement espacée; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés obliquement arqués avec

l'angle postérieur presque droit; la base à peine bisinuée. Écusson petit, subtriangulaire. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries finement granuleux, plans sur le disque, légèrement convexes sur les côtés et au sommet; celui-ci tronqué et faiblement tridenté de part et d'autre. Dessous finement ponctué, presque glabre; prosternum plan, sillonné de part et d'autre.

Stigmodera rustica nov. sp. — *Étroit, allongé, subcylindrique; tête et pronotum verts à reflets cuivreux, la première avec une tache frontale orange, le second bordé latéralement de jaune; élytres bleus bordés latéralement de rouge avec, de part et d'autre, une tache arrondie basilaire, une bande médiane transversale interrompue à la suture, remontant le long du bord extérieur, et une bande préapicale, également interrompue à la suture, le tout jaune et se fondant, vers les côtés, dans la nuance rouge du bord. Dessous entièrement jaune, sauf les pattes, qui sont vertes, de même que les sutures métasternales, le bord des hanches postérieures et des segments abdominaux et une tache sur les côtés de chacun de ceux-ci.* — Long., 7,5; larg., 2,2 mill.

Australie.

Plus petit, plus étroit et plus cylindrique que *St. decemmaculata* Kirby, les bandes et taches élytrales tout autrement disposées.

Tête ponctuée; front légèrement déprimé et garni d'une efflorescence jaune orangé; vertex sillonné. Pronotum convexe, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation fine, dense et régulièrement espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson déprimé et cordiforme. Élytres couverts de séries longitudinales de stries ponctuées; les interstries plans en avant et élevés en arrière, pointillés sur les côtés et lisses contre la suture; le sommet tridenté de part et d'autre avec la dent médiane obtuse, un peu plus longue que la suturale et que l'externe. Dessous finement ponctué; prosternum large, plan et sillonné sur les côtés.

Stigmodera electa nov. sp. — *Oblong, allongé, subcylindrique; tête et pronotum d'un vert obscur légèrement cuivreux; élytres violacés avec trois bandes transversales jaunes, interrompues à la suture : la première, très arquée, longeant la base et les épipleures; la deuxième, transversale, touchant la marge latérale et s'élargissant vers la suture; la troisième préapicale et légèrement arquée. Dessous noir verdâtre à reflets irisés; pattes vertes, obscures et très brillantes.* — Long., 8,5; larg., 3 mill.

Australie (L. Fairmaire).

Taille et facies de *St. parva* Saund., la coloration et l'allure des bandes élytrales différentes.

Tête finement ponctuée; front étroitement creusé, le sillon ne touchant pas le vertex. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation assez dense et finement granuleux; la marge antérieure tronquée; les côtés très arqués au milieu et subsinueux en arrière avec l'angle postérieur aigu, très petit, un peu abaissé et légèrement saillant en dehors; la base bisinuée avec le lobe médian subanguleux. Écusson petit, subpentagonal. Élytres couverts de stries ponctuées assez profondes; les interstries finement granuleux; le sommet à peine échancré de part et d'autre, les dents terminant l'échancrure à peine sensibles. Dessous très finement ponctué et couvert d'une villosité grisâtre; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera mansueta nov. sp. — *Oblong, allongé, subcylindrique; tête cuivreuse; pronotum vert à légers reflets pourprés; élytres bleu violacé avec, de part et d'autre, quatre macules jaunes : la première, oblongue, partant de la base, un peu plus près de la suture que de la marge latérale; la deuxième, étroite et allongée, marginale, le long des épipleures; la troisième subovalaire, un peu oblique, au milieu du disque; la quatrième transversale, un peu arquée, située au tiers postérieur, contre la marge latérale et n'atteignant pas la suture. Dessous noirâtre, couvert d'une vestiture grise.* — Long., 11; larg., 3,5 mill.

Australie.

Voisin de *St. xanthospilota* Hope, mais moins robuste, un peu plus parallèle, le dessin élytral différent; moins acuminé au sommet et un peu plus large que *St. elongatula* Mac Leay, dont le dessin élytral est également différent.

Tête grossièrement et régulièrement ponctuée; front déprimé longitudinalement. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné longitudinalement au milieu, couvert d'une ponctuation assez grossière, dense et régulièrement espacée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian large et peu arqué. Écusson triangulaire. Élytres couverts de stries ponctuées; les interstries finement granuleux, plans en avant et légèrement convexes en arrière; le sommet avec une très petite échancrure suturale oblique limitée de part et d'autre par deux petites dents. Dessous ponctué et couvert d'une abondante villosité d'un blanc argenté; prosternum plan, sillonné sur les côtés.

Stigmodera ocularis nov. sp. — *Oblong ovale, allongé, peu convexe, d'un noir bleuâtre en dessus avec quelques reflets irisés; les élytres ornés de part et d'autre de trois taches jaunes : la première,*

très petite, punctiforme, près de la base, un peu plus près de la marge extérieure que de la suture; la deuxième, assez grande, arrondie, sur le disque, vers le tiers antérieur; la troisième, plus petite que la précédente, elliptique, contre le bord épipleural et s'étendant en partie sur l'épipleure métathoracique. Dessous bleu foncé et brillant. — Long., 6-7; larg., 1,7-2 mill.

Queensland (par Staudinger).

Entièrement différente de toutes les autres espèces du genre auquel elle se rattache incontestablement.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front déprimé; vertex sillonné. Pronotum très convexe, un peu plus large que haut, finement et régulièrement ponctué; la marge antérieure tronquée; les côtés arrondis au milieu, sinueux vers la base, l'angle postérieur légèrement saillant en dehors, très petit et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson pentagonal. Élytres convexes, de la largeur du pronotum et déprimés le long de la base, couverts de stries ponctuées; les interstries peu saillants en avant, costiformes en arrière et très finement pointillés; le sommet échancré et bidenté de part et d'autre et formant un vide sutural anguleux. Dessous chagriné; pattes rugueuses.

Ethon diversum nov. sp. — *Subovalaire, convexe en dessus et d'un vert métallique terne, le pronotum parfois à reflets bronzés; dessous bronzé verdâtre; antennes et tarses noirs.* — Long., 6,5; larg., 2,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Se distingue des autres espèces du genre par l'absence de marbrures villeuses sur les élytres et par le facies moins robuste.

Tête finement granuleuse, excavée; front sillonné, le sillon net, profond et un peu plus large en avant qu'en arrière; yeux bordés d'un sillon. Pronotum très convexe, couvert de points allongés disposés en séries circulaires et concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés subsinueux, obliques, avec l'angle postérieur aigu et arrondi au sommet; carène latérale subsinueuse, assez éloignée de la marge latérale et n'atteignant pas le sommet; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé, subarrondi, à peine échancré au sommet. Écusson semi-circulaire, légèrement déprimé. Élytres assez convexes, un peu plus larges que le pronotum à la base, couverts de séries longitudinales de traits interrompus, séparément arrondis à l'extrémité. Dessous granuleux et ponctué, couvert d'une courte villosité blanche; pattes moins rugueuses et moins villeuses que le restant du corps; tarses assez longs, noirâtres.

Corœbus magnus nov. sp. — *Robuste, allongé, subcylindrique, d'un bronzé violacé en dessus avec le tiers apical des élytres verdâtre*

et couvert d'une large bande d'un gris soyeux. Dessous verdâtre, couvert d'une courte pubescence grise; sternum et pattes obscures; antennes et tarses noirs. — Long., 17; larg., 5,5 mill.

Ile Nias (Staudinger).

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, déprimée en avant, la dépression subtriangulaire, sillonnée en arrière. Pronotum convexe, inégal, bossué, couvert, sur le disque, de rides irrégulières et concentriques, et sur les côtés inférieurs, de boursouflures irrégulières; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian avancé, large et arrondi; les côtés très arqués avec la marge latérale finement crénelée; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson mat, finement granuleux, oblong, transversal, acuminé au sommet. Élytres plans et légèrement creusés sur le disque, très déclives sur les côtés, couverts de points irréguliers plus rapprochés sur les côtés que sur le disque où leurs intervalles forment des rides transversales, irrégulières et anastomosées; ils sont déprimés à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures et conjointement arrondis à l'extrémité. Dessous ponctué, moins rugueux que le dessus, la ponctuation plus grossière et plus espacée au milieu que sur les côtés, qui sont couverts d'une villosité grise, courte et assez dense; pattes ponctuées; tarses courts.

Cisseis frontalis nov. sp. — *Oblong, écourté, élargi; front pourpré; vertex et pronotum vert doré; élytres verts, très brillants avec une bande transversale et préapicale noire, remontant le long de la suture jusqu'au tiers antérieur. Dessous vert doré, très brillant.* — Long., 8; larg., 3 mill.

Nouvelle-Guinée (par Staudinger).

Tête faiblement excavée, finement granuleuse, ponctuée. Pronotum convexe, finement pointillé et couvert de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large, avancé et arrondi; les côtés obliquement arqués avec l'angle postérieur arrondi; la base bisinuée avec le lobe médian large, peu avancé et médiocrement arqué; carène latérale droite. Écusson en triangle équilatéral et curviligne. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, finement granuleux et ponctués, couverts de granulations simulant des petites écailles; le sommet dentelé et séparément arrondi. Dessous moins rugueux que les élytres, finement granuleux et couvert de rugosités simulant des petites écailles.

Cisseis cuprifrons nov. sp. — *Oblong, atténué en avant et en arrière, assez large, peu convexe; tête d'un bronzé cuivreux; pronotum et élytres d'un noir violacé à reflets bronzés, les seconds avec des traces*

de bandes sinueuses, villeuses et grises. Dessous d'un bronzé obscur légèrement pourpré. — Long., 7; larg., 2,8 mill.

Australie.

Voisin de *Ciss. acuducta* Kirb., mais moins robuste, plus obscur, la ponctuation générale plus fine, la carène latérale du pronotum plus éloignée de la marginale.

Tête faiblement excavée, inégalement ponctuée; vertex sillonné. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides circulaires et concentriques dont le centre commun est situé au milieu de la marge antérieure; celle-ci bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi; les côtés obliquement arqués, la base bisinuée avec le lobe médian tronqué; carène latérale subparallèle à la marge latérale. Écusson transversal, tronqué à la base, bisinué au sommet. Élytres peu convexes, couverts de rugosités simulant des petites écailles; les bandes villeuses finement granuleuses; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux.

Cisseis morosa nov. sp. — *Assez large, peu convexe, d'un noir bronzé légèrement violacé, le front un peu pourpré; les élytres avec quelques mouchetures irrégulières grisâtres. Dessous un peu plus brillant que le dessus.* — Long., 8; larg., 3 mill.

Australie.

Voisin de *Ciss. acuducta* Kirby, mais moins brillant, plus sombre, surtout en dessus, les marbrures élytrales remplacées par des mouchetures un peu transversales; également voisin de *Ciss. cuprifrons*, qui précède, mais le pronotum plus convexe.

Tête rugueuse, ponctuée et à peine excavée. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, régulière et de séries transversales de petites rides onduleuses; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués; la carène latérale sinueuse et subparallèle à la marge latérale; la base bisinuée avec le lobe médian large, peu avancé et arqué. Écusson subcordiforme et transversal. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de petites rides transversales et de rugosités simulant des écailles, plus accentuées en avant qu'en arrière; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous finement granuleux, ponctué et couvert de rides anastomosées très fines.

Cisseis ænea nov. sp. — *Elliptique, assez convexe, d'un bronzé plus ou moins pourpré, parfois noir, les élytres ornés de mouchetures villeuses et grises, très irrégulières. Dessous garni d'une courte vestiture grise.* — Long., 13; larg., 4 mill.

Australie : Cocktown (Staudinger); Sidney (Bates).

Espèce très voisine de *Ciss. nubeculosa* Germ., mais toujours plus allongée, plus parallèle sur les côtés et un peu plus convexe en dessus.

Tête finement granuleuse et ponctuée ; front légèrement déprimé ; épistome séparé du front par une carène sinueuse, perpendiculaire à une ligne médiane lisse allant jusqu'au vertex. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation irrégulière et de rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée, les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus et la carène latérale un peu sinueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian arqué. Écusson presque lisse, à granulation excessivement fine, subcordiforme. Élytres rugueux, couverts de rugosités simulant des petites écailles anguleuses et aiguës ; les parties villeuses finement granuleuses, irrégulières, disposées en taches peu voyantes ; la base déprimée de part et d'autre, les côtés sinueux à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet ; celui-ci séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux et ponctué.

Cisseis aurulenta nov. sp. — *Elliptique, assez convexe, d'un bronzé doré très brillant en dessus, les élytres ornés de mouchetures irrégulières blanches. Dessous vert doré très brillant, les côtés de l'abdomen déprimés de part et d'autre et garnis d'une villosité blanche.* — Long., 9 ; larg., 3 mill.

Australie.

Plus rugueux en dessus que le *Ciss. albosparsa* Cast. et Gory, les mouchetures élytrales plus grandes et plus nombreuses, le dessous entièrement différent.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée ; épistome séparé du front par une carène sinueuse plus nette au-dessus des cavités antennaires qu'au milieu ; front déprimé au-dessus de l'épistome, la dépression assez accentuée. Pronotum assez convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une grosse ponctuation inégale et irrégulièrement espacée, obliquement déprimé de part et d'autre dans l'angle antérieur ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux ; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson triangulaire. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts d'une ponctuation irrégulière et de rugosités simulant des petites écailles alternant avec des mouchetures inégales, très espacées et disposées irrégulièrement, finement granuleuses dans leur fond et couvertes d'une villosité blanche ; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux et ponctué ; les côtés des segments abdominaux déprimés à la base, la dépression garnie d'une villosité blanche.

Cisseis viridicuprea nov. sp. — *Elliptique, assez convexe, d'un cuivreux éclatant en dessus avec, sur chaque élytre, quatre petites taches d'un blanc pur et situées : la première vers le milieu, près de la marge latérale; les deux suivantes au tiers supérieur, l'une contre la suture et l'autre un peu plus haut, près de la marge latérale; la quatrième à l'apex. Dessous bronzé à reflets pourprés et très brillant, les côtés de l'abdomen et du sternum tachetés de blanc pur.* — Long., 9; larg., 3 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Plus grand et plus convexe que *Ciss. albosparsa* Cast. et Gory, les mouchetures élytrales plus petites, le sillon frontal plus accentué; le dessous différent.

Tête inégalement ponctuée, sillonnée en arrière et déprimée en avant; l'épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulière et de fines rides circulaires et concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus et la carène latérale droite et assez rapprochée de la marge; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson subcordiforme, transversal, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de points linéaires alternant avec des très petites rides transversales, légèrement déprimés le long de la suture; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux et ponctué.

Cisseis splendida nov. sp. — *Elliptique, assez convexe, tête vert doré; pronotum cuivreux à reflets verts; élytres bleu violacé, sauf la moitié extérieure de la région antérieure qui est semblable au pronotum; le tiers postérieur orné de mouchetures grises disposées suivant une ligne transversale courbe. Dessous bronzé doré verdâtre.* — Long., 10; larg., 4 mill.

Australie : Cocktown (par Staundinger).

Du groupe des *Ciss. cruciata* Fab., *semirugosa* Thoms., *cuprifera* Gestro, *dimidiata* Mac Leay, etc., mais plus robuste, la nuance bleue des élytres remontant jusqu'à la base.

Tête assez convexe, à peine déprimée au milieu, couverte d'une grosse ponctuation dense et régulièrement espacée. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides circulaires et concentriques dont le centre commun paraît situé vers le milieu de la marge antérieure; celle-ci bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés obliquement et régulièrement arqués avec l'angle postérieur droit et la carène latérale subparallèle à la marge; la base bisinuée avec le lobe médian faible-

ment échancré en arc. Écusson subcordiforme et transversal. Elytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts d'une ponctuation régulière alternant avec des rides sinueuses et transversales plus accentuées sur les côtés antérieurs; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous finement granuleux, irrégulièrement ponctué et couvert de rugosités simulant des écailles.

Cisseis fulgidifrons nov. sp. — *Oblong, peu convexe; tête rouge feu; pronotum et écusson vert doré; élytres noir bleuâtre mouchetés de blanc. Dessous vert doré; les côtés du sternum et ceux des segments abdominaux garnis d'une efflorescence blanche.* — Long., 12; larg., 4 mill.

Australie.

Espèce très voisine des *Ciss. stigmata* Cast. et Gory et *cupreicollis* Hope, mais avec les mouchetures élytrales beaucoup plus petites; un peu plus large que le premier, le pronotum beaucoup plus rugueux; le dessous entièrement différent du second.

Tête à ponctuation dense, plus épaisse en avant qu'en arrière; épistome séparé du front par une carène sinueuse; front déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points irréguliers, plus denses sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure bisinuée; les côtés arqués en avant et presque droits en arrière avec l'angle postérieur obtus et la carène latérale subparallèle à la marge; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson très large, granuleux. Élytres rugueux, couverts de séries transversales de petites rides, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux et couvert de rugosités et de petites rides simulant des écailles.

Cisseis cupriventris nov. sp. — *Oblong, peu convexe; tête, pronotum et écusson vert doré, le dernier garni sur les côtés d'une efflorescence blanche; élytres bronzés à légers reflets cuivreux, ornés de mouchetures blanches. Dessous d'un cuivreux pourpré très brillant, les côtés du sternum et ceux de l'abdomen ornés de taches efflorescentes et blanches.* — Long., 10; larg., 3,1 mill.

Australie.

Voisin de *Ciss. cupreicollis* Hope, quant au facies, mais un peu moins robuste.

Tête finement granuleuse et ponctuée, les points moins épais et plus rapprochés en avant qu'en arrière; épistome séparé du front par une carène arquée; front à peine déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation irrégulière et de petites raies sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et

peu arqué; les côtés obliquement arqués avec l'angle postérieur obtus et la carène latérale subparallèle à la marge et assez éloignée de celle-ci; la base bisinuée avec le lobe médian faiblement échancré. Écusson subcordiforme, transversal, un peu cintré en avant à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis nitidicollis nov. sp. — *Oblong, assez convexe; tête verte; pronotum cuivreux à reflets verts; écusson et élytres violacés avec des mouchetures irrégulières grises. Dessous bronzé, brillant à reflets verts.* — Long., 8; larg., 3 mill.

Australie.

Beaucoup plus petit et moins grossièrement ponctué en dessus que *Ciss. cupreicollis* Hope, dont il se rapproche par le système de coloration du dessus.

Tête finement granuleuse et couverte de points fins régulièrement espacés; épistome séparé du front par une carène arquée; front à peine déprimé. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation régulière et de séries de petites rides parallèles et sinueuses; la marge antérieure bisinuée; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus et la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la base. Élytres un peu plus larges que le pronotum à la base, finement granuleux et couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux et couvert de raies fines simulant des écailles.

Cisseis nigroænea nov. sp. — *Oblong, allongé, d'un noir bronzé en dessus. Dessous bronzé, un peu plus brillant que le dessus et couvert d'une courte villosité grise.* — Long., 7,5; larg., 2,4 mill.

Australie sept. (par Staudinger).

La forme allongée, l'absence de mouchetures ou de marbrures pubescentes sur les élytres et la coloration uniforme distinguent cette espèce de toutes les autres du genre.

Tête déprimée, densément ponctuée; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, un peu plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de séries de rides concentriques dont le centre commun se trouve au milieu de la marge antérieure; celle-ci fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés faiblement arqués avec la carène latérale assez rapprochée de la marge et parallèle à celle-ci; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson

rugueux, ponctué, subcordiforme, transversal, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de granulations simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement chagriné.

Cisseis cyanura nov. sp. — *Oblong, allongé, subcylindrique, légèrement atténué en avant et en arrière, d'un bleu obscur en dessus, parfois verdâtre; tête légèrement cuivreuse; les élytres ornés de vagues mouchetures irrégulières et grises. Dessous noir verdâtre à reflets pourprés ou violacés; antennes et tarses obscurs.* — Long., 7 ; larg., 2 mill.

Australie (par Staudinger).

D'une coloration générale obscure, assez variable. Sa forme cylindrique, atténuée aux extrémités, le distingue des espèces précédentes et le rapproche du *Ciss. nigroœnea* qui précède.

Tête finement granuleuse, à ponctuation régulièrement espacée; épistome séparé du front par une carène sinueuse; front faiblement déprimé. Pronotum convexe, un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points régulièrement espacés et de rides concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian arrondi; les côtés régulièrement arqués; la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué. Écusson rugueux, subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux et couvert de rugosités simulant des écailles.

Cisseis viridis nov. sp. — *Allongé, oblong, peu convexe, entièrement vert doré en dessus, parfois avec des reflets cuivreux. Dessous d'un bronzé clair et garni d'une abondante efflorescence blanche.* — Long., 8; larg., 2,6 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Facies de *Ciss. nigroœnea* qui précède; différent de celui-ci par le mode de coloration et la ponctuation.

Tête rugueuse, grossièrement et inégalement ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur, le sillon élargi en avant; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian arrondi. Écusson subcordiforme, transversal et granuleux. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, rugueux et couverts de rides transversales et sinueuses, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux et ponctué.

Cisseis nitida nov. sp. — *Oblong ovale, d'un vert doré très brillant en dessus, avec des traces de mouchetures blanches sur les élytres. Dessous bronzé, brillant et couvert sur les côtés de macules efflorescentes blanches.* — Long., 7; larg., 2,5 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Un peu moins robuste et plus rugueux que *Ciss. albosparsa* Cast. et Gory, dont il se rapproche par le facies, mais tout autrement coloré.

Tête ponctuée, la ponctuation assez épaisse et régulièrement espacée; front sillonné, le sillon plus large en avant qu'en arrière; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, régulièrement ponctué et couvert de rides concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés arqués en avant et presque droits avant le milieu avec l'angle postérieur aigu; la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson cordiforme, pointillé, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts d'une ponctuation régulière dont les intervalles, finement granuleux, forment des plis sinueux, irréguliers et transversaux; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous finement granuleux.

Cisseis ignicollis nov. sp. — *Oblong, assez convexe; tête, pronotum et écusson cuivreux ou vert doré très brillant; élytres violacés à mouchetures grises. Dessous bronzé cuivreux clair et brillant.* — Long., 6; larg., 2 mill.

Australie : Port Denison.

Beaucoup plus petit et plus étroit que le *Ciss. cupreicollis* Hope, dont il rappelle le mode de coloration.

Tête régulièrement ponctuée, finement granuleuse et faiblement excavée; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum convexe, un peu plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points régulièrement espacés et de rides concentriques dont le centre commun est situé au milieu de la marge antérieure; celle-ci bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué. Écusson transversal et subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, granuleux et couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis vicina nov. sp. — *Elliptique, peu convexe, d'un vert métallique clair; élytres noirs avec quelques mouchetures éparses,*

blanches. Antennes et tarses noirs. — Long., 6; larg., 2,3 mill.

Australie (Staudinger).

Facies et taille de *Ciss. viridiaurea* Mac Leay, mais très différent par la coloration et les détails qui suivent.

Tête finement granuleuse, couverte de points régulièrement espacés, sillonnée dans toute sa longueur; épistome séparé du front par une carène échancrée en arc. Pronotum plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de raies circulaires et concentriques; la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés régulièrement arqués; la carène latérale sinueuse; la base faiblement bisinuée avec le lobe médian peu avancé et à peine arqué. Écusson rugueux, en triangle élargi. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis tasmanica nov. sp. — *Elliptique, assez convexe; tête verdâtre; pronotum bronzé; élytres noirs, brillants, très légèrement bronzés avec quelques macules grises plus sensibles sur la région postérieure et disposées en séries transversales; dessous noir et très brillant; une tache blanchâtre sur les côtés de chacun des segments abdominaux.* — Long., 6; larg., 2 mill.

Tasmanie (par Chevrolat et R. Oberthür).

Un peu moins robuste et un peu plus convexe que le précédent; la coloration différente; la tête plus granuleuse, avec la ponctuation plus dense, le sillon frontal à peine accusé, la carène séparant le front de l'épistome sensible seulement au-dessus des cavités antennaires. Pronotum ridé transversalement; les rides sinueuses; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué. Écusson transversal, subcordiforme, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et faiblement déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis viridana nov. sp. — *Étroit, convexe, elliptique, d'un beau vert émeraude et très brillant; les élytres avec des traces de marbrures transversales blanches. Antennes et tarses noirs.* — Long., 4,5; larg., 1,5 mill.

Australie sept. (Staudinger).

Ressemble un peu au *Melibœus amethystinus* Oliv., du midi de l'Europe, quant au facies et à la coloration.

Tête convexe, très finement granuleuse, à ponctuation peu dense et régulièrement espacée; front à peine déprimé au-dessus de

l'épistome et séparé de celui-ci par une carène peu prononcée et légèrement courbe. Pronotum peu convexe, plus large que haut et un peu plus étroit en avant qu'en arrière, finement granuleux et couvert de petites rides semi-circulaires à peine sensibles; la marge antérieure bisinuée; les côtés arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et à peine arqué, tronqué au-dessus de l'écusson. Ce dernier oblong, quadrangulaire et transversal en avant, très acuminé en arrière, la partie oblongue séparée de l'autre par une carène transversale. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles et, sur la région antérieure, de petites rides transversales; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous très finement granuleux.

Cisseis coræboides nov. sp. — *Subovalaire, convexe, entièrement vert; le pronotum et l'abdomen parfois cuivreux ou dorés. Antennes et tarses obscurs.* — Long., 5; larg., 2,2 mill.

Australie (par L. Fairmaire); Tasmanie (par Staudinger).

Plus robuste, plus large, moins cylindrique et d'un vert moins brillant que le *Ciss. viridana* qui précède.

Tête très finement granuleuse, faiblement ponctuée; épistome séparé du front par une carène très sinueuse; front surmonté d'une ligne lisse en avant et d'un très fin sillon en arrière. Pronotum presque aussi haut que large, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides transversales un peu sinueuses; la marge antérieure tronquée; les côtés un peu obliques en avant et presque droits en arrière avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson en triangle élargi. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis cincta nov. sp. — *Écourté, oblong, assez convexe; dessous, tête et côtés du pronotum d'un vert doré; milieu du pronotum et élytres d'un bronzé pourpré, ces derniers avec la marge latérale et la région basilaire nuancées de pourpre. Antennes et tarses obscurs.* — Long., 6,3; larg., 2,3 mill.

Australie (par R. Oberthür).

La tête relativement large, la forme générale écourtée et le système de coloration distinguent cette espèce des précédentes.

Tête finement granuleuse et ponctuée; front faiblement caréné en avant et sillonné en arrière; épistome séparé du front par un sillon très sinueux. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation et de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure à peine arquée

les côtés obliques en avant et presque droits en arrière avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian un peu avancé et tronqué. Écusson triangulaire, élargi. Élytres de la largeur du pronotum et faiblement déprimés de part et d'autre à la base, couverts de petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis scabrosula nov. sp. — *Assez large, peu convexe, atténué en avant et en arrière; tête, pronotum et suture d'un cuivreux brillant; élytres noirs avec quelques vagues marbrures transversales grises. Dessous brillant, d'un bronzé cuivreux; antennes et tarses obscurs.* — Long., 6,2; larg., 2,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Voisin de *Ciss. acuducta* Kirby, mais moins robuste, différent quant aux détails qui suivent.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée, à peine déprimée en avant; l'épistome séparé du front par une carène visible seulement au-dessus des cavités antennaires. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides sinueuses et transversales; la marge antérieure à peine bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian arrondi. Écusson subcordiforme, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis pauperula nov. sp. — *Oblong, peu convexe; tête verte et brillante; pronotum bronzé verdâtre brillant; élytres noirâtres, légèrement bronzés, avec quelques mouchetures éparses et grises. Dessous brillant, d'un vert bronzé; antennes et tarses noirs.* — Long., 5,5; larg., 1,8 mill.

Australie (par Chevrolat).

Moins robuste et moins convexe que *Ciss. tasmanica* qui précède, il s'en rapproche par le facies.

Tête finement granuleuse et sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense et régulièrement espacée et de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés faiblement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson subcordiforme, tronqué à la base. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles

et de petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis inops nov. sp. — *Écourté, assez convexe, d'un pourpré violacé en dessus avec des traces de mouchetures grises sur la région postérieure des élytres. Dessous brillant, noirâtre, légèrement bronzé.* — Long., 5; larg., 1,8 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Tête granuleuse et finement ponctuée, déprimée au-dessus de l'épistome; celui-ci séparé du front par une carène anguleusement échancrée. Pronotum peu convexe, plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une fine ponctuation et de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian faiblement échancré. Écusson triangulaire. Élytres assez convexes, de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux.

Cisseis nigrita nov. sp. — *Assez convexe; tête verte; pronotum noir à reflets pourprés; élytres noirs avec quelques traces de marbrures transversales grises. Dessous brillant, bronzé noirâtre; antennes et tarses obscurs.*— Long., 5,5; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Facies de l'espèce précédente, mais plus convexe, les côtés du pronotum plus abaissés et plus déprimés; le système de coloration entièrement différent.

Tête granuleuse, finement et régulièrement ponctuée; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum assez convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, finement granuleux et couvert de fines rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arrondi; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et faiblement échancré. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis viridiceps nov. sp. — *Écourté, assez convexe; tête verte; pronotum bronzé; élytres noirs, légèrement violacés avec des traces de marbrures transversales grises. Dessous brillant, vert obscur; antennes et tarses noirs.* — Long., 4; larg., 1,5 mill.

Australie (par Staudinger).

Très voisin de *Ciss. nigrita* qui précède, mais plus écourté et un peu moins convexe.

Tête granuleuse, densément et finement ponctuée, faiblement sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides semi-circulaires et concentriques en avant et sinueuses en arrière; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et arqué. Écusson pentagonal, acuminé au sommet. Élytres convexes, de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis Fairmairei nov. sp. — *Assez rugueux, écourté, peu convexe; tête verte; pronotum bronzé, à peine verdâtre; élytres bronzé cuivreux. Dessous bronzé verdâtre et brillant; antennes et tarses obscurs.* — Long., 5,5; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

La tête assez forte, les yeux saillants, la surface granuleuse du dessus distinguent nettement cette espèce de celles qui précèdent.

Tête granuleuse, déprimée en avant, sillonnée en arrière. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian arqué. Écusson triangulaire. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des écailles et des rides transversales, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous granuleux.

Cisseis rubicunda nov. sp. — *Écourté, assez convexe; tête verdâtre, dorée; pronotum bronzé; élytres pourprés, marbrés de taches violacées et obscures et de bandes villeuses grises peu apparentes; la région scutellaire bronzée, claire et brillante. Dessous bronzé pourpré brillant; antennes et tarses obscurs.* — Long., 5,2; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Tête granuleuse et très finement pointillée, à peine déprimée en avant; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum assez convexe, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de très fines rides sinueuses en arrière et concentriques en avant; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés arqués, avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson subcordiforme, finement pointillé. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et

d'autre à la base, finement granuleux, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis modesta nov. sp. — *Écourté, assez convexe; tête verte; pronotum et région scutellaire cuivreux pourpré brillant; élytres d'un noir violacé avec des traces de marbrures grises. Dessous bronzé, brillant et légèrement pourpré; antennes et tarses noirs.* — Long., 5; larg., 1,7 mill.

Australie : Stark (par Chevrolat).

Voisin de *Ciss. rubicunda* qui précède, mais le sillon frontal mieux accentué, le pronotum plus convexe et la coloration différente.

Tête très finement granuleuse et couverte de points fins, denses et régulièrement espacés; front à peine déprimé en avant; épistome séparé du front par une carène arquée et rugueuse. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, granuleux et ponctué comme la tête; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et échancré. Écusson en triangle curviligne et finement granuleux. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, granuleux et couverts de petites rides transversales, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux.

Cisseis semiobscura nov. sp. — *Écourté, assez convexe; dessous, tête, pronotum et région scutellaire pourprés; élytres violacés avec des mouchetures irrégulières d'un gris clair; les côtés des hanches postérieures et ceux de chacun des segments abdominaux ornés d'une tache villeuse et blanche. Antennes et tarses obscurs.* — Long., 5; larg., 1,8 mill.

Facies de *Ciss. modesta,* qui précède, mais diffèrent quant à certains détails de structure et quant à la coloration.

Tête très finement granuleuse, à ponctuation dense et régulièrement espacée; front à peine sillonné. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, granuleux et ponctué comme la tête et couvert de très fines rayures sinueuses et transversales; la marge antérieure tronquée; les côtés assez arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et à peine échancré. Écusson subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, granuleux et couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseis puella nov. sp. — *Petit, écourté, très convexe, entièrement noir à reflets bronzés; les élytres ornés de marbrures transversales grises. Dessous bronzé brillant et obscur.* — Long., 4; larg., 1,5 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Plus petit, relativement plus large et plus trapu que *Ciss. semi-obscura*, qui précède.

Tête rugueuse, couverte de petites rides longitudinales, un peu obliques et sinueuses; front sillonné; épistome séparé du front par une carène sinueuse. Pronotum plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, convexe sur le disque, déprimé de part et d'autre sur les côtés, couvert d'un réseau de rides sinueuses entrecroisées; la marge antérieure tronquée; les côtés arqués avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. Écusson pentagonal, couvert de stries transversales. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux.

Cisseis simplex nov. sp. — *Petit, oblong, convexe; dessus bronzé pourpré plus ou moins foncé, les élytres souvent plus foncés que le pronotum. Dessous noir de fumée, brillant et légèrement bronzé, parfois cuivreux.* — Long., 3,8; larg., 1,4 mill.

Australie (par Staudinger).

Relativement moins large que le *Ciss. puella* qui précède, plus cylindrique et un peu plus convexe.

Tête finement granuleuse, couverte de points très fins; front sillonné avec une fossette médiane. Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation et d'une granulation semblables à celles de la tête et de petites rides sinueuses et transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian subanguleux; les côtés arqués en avant et presque droits en arrière avec la carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian à peine échancré. Écusson subcordiforme et légèrement convexe. Élytres de la largeur du pronotum et déprimés de part et d'autre à la base, couverts de rugosités simulant des très petites écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux.

Cisseoides albopicta nov. sp. — *Subheptagonal, trapu, peu convexe, d'un noir brillant et légèrement bronzé, les côtés du pronotum garnis d'une villosité blanche très dense retenant une poussière de même nuance; les élytres ornés en avant de marbrures semblables formant, au tiers apical, une large bande oblique. Dessous plus brillant que le dessus, les côtés inférieurs du prosternum et ceux des segments abdominaux maculés de blanc.* — Long., 7; larg., 2,7 mill.

Australie (Chevrolat).

Voisin de *C. marmoratus* Mac Leay, mais un peu moins robuste, moins convexe, la coloration générale plus bronzée, les taches et macules blanches plus nettes, la bande préapicale beaucoup plus

large, les côtés du pronotum plus déprimés et plus abaissés, son disque un peu plus convexe.

Tête irrégulièrement ponctuée; front sillonné avec trois vagues fossettes en avant; épistome séparé du front par un sillon sinueux. Pronotum transversal, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides semi-circulaires et concentriques et de points irrégulièrement espacés; le disque convexe en avant, les côtés déprimés et couverts d'une abondante villosité retenant une pulvérulence blanchâtre; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés arqués avec une carène formant la corde de la marge latérale, et l'angle postérieur obtus; la base bisinuée avec le lobe médian légèrement échancré. Écusson cordiforme. Élytres déprimés de part et d'autre à la base, couverts, sur les parties dénudées, de rugosités simulant des petites écailles et, sur les parties villeuses, d'une très fine ponctuation; les côtés sinueux à hauteur des hanches postérieures, élargis au tiers supérieur, atténués ensuite et séparément arrondis au sommet. Dessous couvert de petites rides sinueuses simulant des très petites écailles; marge antérieure du prosternum échancrée; un sillon marginal autour de l'abdomen; pattes ponctuées.

Cisseoides cyanura nov. sp. — *Subcylindrique, écourté, convexe, atténué en avant et en arrière, d'un bleu très foncé avec le front, l'écusson et les pattes bronzés; les élytres ornés de marbrures villeuses et grises.* — Long., 6; larg., 2,2 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Un peu plus petit et plus convexe que *C. albopicta* qui précède; entièrement différent de celui-ci quant au facies et au système de coloration.

Tête irrégulièrement ponctuée; front sillonné longitudinalement, déprimé en avant et bituberculé au milieu; épistome séparé du front en arrière par un sillon sinueux. Pronotum inégal, convexe en avant, déprimé sur les côtés et plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de petites rides sinueuses sur les côtés et concentriques sur le disque; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian saillant et subanguleux; les côtés obliques avec l'angle postérieur obtus; la base bisinuée avec le lobe médian faiblement échancré; carène latérale située à une certaine distance de la marge, très sinueuse, partant de l'angle postérieur pour aboutir à la marge antérieure. Écusson bronzé, rectangulaire et transversal à la base, acuminé au sommet. Élytres couverts de rugosités simulant des petites écailles, déprimés de part et d'autre à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur et séparément arrondis à

l'extrémité. Dessous granuleux et couvert de rugosités simulant des petites écailles ; marge antérieure du prosternum échancrée ; pattes ponctuées.

Cisseoides modesta nov. sp. — *Oblong, convexe, atténué en avant, arrondi en arrière, entièrement noir, la tête et le pronotum un peu plus clairs que les élytres et légèrement bronzés, les côtés du pronotum et les marbrures élytrales garnis d'une villosité d'un blanc grisâtre.* — Long., 5,5 ; larg., 2 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Moins robuste, relativement plus étroit que *C. cyanura* qui précède, la coloration différente.

Tête rugueuse et inégalement ponctuée; front faiblement sillonné, à peine bituberculé en avant; épistome séparé du front par un sillon sinueux et transversal. Pronotum très convexe sur le disque, déprimé en avant et sur les côtés, couvert de petites rides concentriques; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé; les côtés obliques, avec les angles antérieurs et postérieurs arrondis; la base bisinuée avec le lobe médian à peine échancré; carène latérale sinueuse, subparallèle à la marge et située à une certaine distance de celle-ci. Écusson rectangulaire et transversal en avant, acuminé en arrière, légèrement bronzé. Élytres très granuleux, couverts de rugosités simulant des écailles, légèrement déprimés de part et d'autre à la base, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite et dentelés sur les côtés jusqu'au sommet qui est séparément arrondi. Dessous moins rugueux que les élytres, les rugosités simulant des petites écailles ; pattes ponctuées.

Hypocisseis æneipes nov. sp. — *Écourté, convexe en dessus, plan en dessous, entièrement noir à reflets cuivreux ; le front, les bords inférieurs du pronotum, les fémurs et les tibias d'un cuivreux pourpré; les élytres ornés de vagues marbrures de poils grisâtres.* — Long., 9; larg., 3,7 mill.

Australie.

Espèce voisine de *H. brachyformis* H. Deyr., de Mysole, mais différente de celle-ci quant à la coloration ; les côtés antérieurs du pronotum plus dilatés en avant.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, déprimée et sillonnée en avant, sur le front, et sillonnée en arrière. Pronotum très transversal, assez convexe en avant, déprimé sur les côtés et vers la base, couvert de rugosités et de petites rides sinueuses, concentriques sur la partie antérieure et élevée du disque ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé ; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus ; la carène latérale très sinueuse et située à une certaine distance de la marge ; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé.

Écusson triangulaire avec les angles latéraux arrondis. Élytres assez convexes, rugueux, écailleux, déprimés de part et d'autre à la base, sinueux sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, atténués ensuite et dentelés jusqu'au sommet où ils sont séparément arrondis. Dessous granuleux; marge antérieure du prosternum faiblement échancrée; pattes finement granuleuses et ponctuées.

Amorphosoma javanum nov. sp. — *Oblong, allongé, convexe, plan en avant, déclive en arrière, d'un noir bleuâtre avec le front bronzé; couvert en dessus d'une vestiture grise et d'une bande préapicale formée de poils d'un roux doré. Dessous presque glabre.* — Long., 8,5; larg., 2,7 mill.

Java (Staudinger).

Voisin de l'*Am. spathatum* Kerr., de Birmanie, quant à la taille et la dilatation de l'extrémité des élytres; différent de celui-ci quant aux détails de sculpture et de coloration.

Tête rugueuse, couverte de rides transversales, sillonnée dans toute sa longueur; front orné en arrière de deux faisceaux de poils roussâtres. Pronotum très convexe, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés très déclives et aplanis sur les bords avec la marge latérale crénelée; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian très légèrement échancré; les côtés régulièrement arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian large, avancé, oblique sur ses côtés et tronqué au milieu. Écusson triangulaire et mat. Élytres convexes, déclives en arrière, grossièrement chagrinés, plans sur le disque, dilatés en spatule au sommet, l'extrémité fortement dentelée, arrondie sur les côtés et échancrée en arc au milieu. Dessous granuleux, moins rugueux que le dessus; pattes ponctuées.

Gen. ALCINOUS H. Deyr.

Pas de mentonnière au prosternum. — Prothorax plus ou moins sinueux à la base, mais jamais coupé droit. — Antennes dentées à partir du cinquième article. — Tibias de forme normale. — Cavité sternale formée seulement, au moins latéralement, par le mésosternum. — Prosternum reposant en arrière sur le métasternum, celui-ci formant le fond de la cavité, mais non échancré; corps court.

Ces caractères ont été pris sur une espèce inédite de La Ferté, l'*Agrilus nodosus*, de l'Australie, que j'ai retrouvée dans la collection de M. L. Fairmaire. Cela me permet de compléter la description du genre établi par M. H. Deyrolle (*Buprestides de la Malaisie; Ann. Soc. Ent. Belge*, t. VIII, 1864, p. 115) et de décrire le type.

Tête convexe, profondément sillonnée dans toute sa longueur;

épistome étroit, sa marge lobée en avant des cavités antennaires, échancrée en arc au milieu; *cavités antennaires* grandes, arrondies; *front* séparé de l'épistome par une carène droite; *antennes* dentées à partir du cinquième article; *menton* triangulaire, découvert; *joues* dentées.

Pronotum inégal, bossué, assez convexe, caréné de part et d'autre à une certaine distance de la marge latérale qui est lisse, sinueuse et tranchante.

Écusson transversal, en losange.

Élytres convexes, inégaux, bossués, séparément arrondis à l'extrémité.

Prosternum tronqué en avant, sans mentonnière, étroit et plan en arrière, son extrémité reposant au milieu contre le métasternum, qui est à peine échancré, et ses côtés sur les branches latérales du mésosternum.

Abdomen assez convexe, le premier et le deuxième segment soudés, la soudure visible, plus longs à eux deux que les trois suivants réunis; le troisième et le quatrième subégaux entre eux; le dernier subtriangulaire, arrondi au sommet, sillonné le long du bord.

Hanches postérieures sensiblement dilatées en dedans et rétrécies en dehors, leur marge antérieure sinueuse.

Pattes peu robustes; *fémurs* fusiformes; *tibias* droits, *tarses* très courts.

Alcinous nodosus (La Ferté mss.) nov. sp. — *Oblong, convexe, atténué en avant et en arrière, entièrement noir bleuâtre et brillant en dessus avec, sur les élytres, des traces de bandes pubescentes, sinueuses et grises. Dessous bleu foncé.* — Long., 7; larg., 2 mill.

Australie (par L. Fairmaire).

Tête convexe, ponctuée, profondément sillonnée longitudinalement; épistome séparé du front par une carène transversale. Pronotum un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides sinueuses; le disque sillonné longitudinalement au milieu, le sillon n'atteignant pas les extrémités; les côtés du disque profondément impressionnés de part et d'autre du sillon; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés un peu obliques en avant et droits en arrière, l'angle antérieur impressionné, le postérieur presque droit; carène latérale très sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et faiblement arqué. Écusson triangulaire. Élytres assez convexes, inégaux, bosselés, couverts de petites rides transversales et sinueuses, déprimés de part et d'autre sur les côtés à la base, le long de la suture et le long de la marge, les dépressions formant des replis sinueux;

le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous granuleux ; pattes ponctuées.

Alcinous minor nov. sp. — *Petit, subcylindrique, atténué en avant et en arrière, noir en dessus avec çà et là des espaces bronzés plus ou moins métalliques; les élytres ornés de vagues bandes pubescentes grises. Dessous bleu foncé.* — Long., 5 ; larg., 1,5 mill.

Nouvelle-Galles du Sud (Staudinger).

Beaucoup plus étroit et moins robuste que l'*A. nodosus* qui précède, il a le pronotum relativement moins allongé et plus dilaté sur les côtés et le système de coloration du dessus est entièrement différent.

Tête convexe, ponctuée, profondément sillonnée ; épistome séparé du front par une carène transversale. Pronotum un peu plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de points irréguliers et de rides sinueuses ; le disque impressionné longitudinalement, l'impression n'atteignant ni la base ni le sommet; les côtés du disque impressionnés de part et d'autre de la dépression médiane ; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et subanguleux; les côtés un peu arqués en avant et légèrement obliques avec l'angle postérieur arrondi; la base bisinuée avec le lobe médian légèrement échancré ; carène latérale très sinueuse. Élytres assez convexes, très déclives en arrière, inégaux et bossués, avec des reliefs dont les plus saillants sont situés vers la base, de part et d'autre de la suture, en arrière de la dépression basilaire ; le sommet séparément arrondi et inerme. Dessous granuleux ; pattes finement granuleuses.

Paracephala crassa nov. sp. — *Court, épais, bombé, subcylindrique, d'un bronzé obscur et couvert, sur tout le corps, d'une courte villosité blanche assez espacée.* — Long., 5,3 ; larg., 2,1 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Beaucoup plus petit, plus trapu et presque aussi large que le *P. pistacina* Hope, le type du genre ; il s'en distingue aussi par l'absence des taches villeuses blanches des côtés des segments abdominaux.

Tête ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur ; épistome étroitement échancré en arc. Pronotum convexe, ponctué, plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge antérieure tronquée ; les côtés arqués ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et tronqué. Écusson petit, triangulaire. Élytres rugueux, convexes, séparément arrondis et inermes à l'extrémité. Dessous moins rugueux que le dessus, couvert d'une villosité blanchâtre molle et très espacée ; pattes finement ponctuées.

Paracephala intermedia nov. sp. — *Subcylindrique, assez convexe, d'un bronzé très obscur; les côtés du pronotum et ceux des segments abdominaux et du sternum couverts d'une pulvérulence blanche.* — Long., 6; larg., 1,7 mill.

Gayndah (par L. Fairmaire).

Voisin de *P. crassa* qui précède, mais beaucoup moins trapu et intermédiaire entre celui-ci et le *P. cylindrica* qui suit.

Tête ponctuée; front profondément et nettement sillonné, le sillon n'atteignant ni l'épistome ni le vertex; épistome situé sur un plan inférieur au front et séparé de celui-ci par une carène anguleuse. Pronotum ponctué, couvert de petites rides concentriques, très convexe, plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure tronquée; les côtés un peu obliques; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et tronqué. Écusson médiocre, triangulaire. Élytres grossièrement chagrinés et granuleux, convexes, vaguement évidés le long de la suture, séparément arrondis et finement dentelés au sommet. Dessous finement granuleux; pattes ponctuées.

Paracephala cylindrica nov. sp. — *Subcylindrique, allongé, d'un bronzé clair et cuivreux, plus brillant en dessous qu'au-dessus, couvert d'une villosité blanche, courte et espacée en dessus, plus dense en dessous, surtout sur les côtés des segments abdominaux et du sternum où elle retient une pulvérulence d'un blanc laiteux.* — Long., 6; larg., 1,6 mill.

Port Denison (par L. Fairmaire).

Plus étroit, plus allongé et d'une coloration plus claire que le *P. intermedia* qui précède, il a le pronotum relativement moins convexe et plus allongé et les élytres plus plans.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front sillonné, le sillon plus net en arrière qu'en avant. Pronotum rugueux, couvert de rides transversales, plus large que haut, très convexe; la marge antérieure arquée; les côtés parallèles, légèrement arrondis en avant; la base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué. Écusson très petit, triangulaire et rugueux. Élytres convexes, plus rugueux que le pronotum, très chagrinés, séparément arrondis et inermes au sommet. Dessous finement granuleux; pattes ponctuées.

Paracephala minuta nov. sp. — *Étroit, cylindrique, allongé, d'un vert glauque clair et couvert d'une villosité blanche, courte et assez dense.* — Long., 4; larg., 0,8 mill.

Australie (par Chevrolat).

Très distinct des autres espèces du genre par sa petite taille, sa forme allongée et sa coloration.

Tête convexe, finement ponctuée; front sillonné, le sillon linéaire

et peu profond. Pronotum finement ponctué, plus large que haut, convexe; la marge antérieure tronquée; les côtés sinueux avec l'angle postérieur abaissé et légèrement saillant en dehors; la base bisinuée avec le lobe médian large et tronqué. Écusson assez grand, triangulaire. Élytres convexes, plus rugueux que le pronotum, couverts de rugosités simulant des écailles, séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous très finement granuleux; pattes à peine ponctuées.

Agrilus asiaticus nov. sp. — *Allongé, peu convexe, atténué à l'extrémité, tête et pronotum d'un bronzé verdâtre sombre; élytres noirâtres; dessous d'un vert obscur.* — Long., 8; larg., 1,7 mill.

Mandchourie.

Voisin de l'*Agr. elongatus* Herbst, commun dans toute l'Europe, mais avec le pronotum un peu plus élargi en avant et différent de celui-ci par les détails qui suivent.

Tête plane, finement granuleuse; vertex à peine sillonné. Pronotum un peu plus haut que large, un peu plus large en avant qu'en arrière, couvert de petites rides transversales; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et arqué; les côtés obliques et faiblement arqués avec l'angle postérieur légèrement saillant en dehors, petit et aigu; la base fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et échancré en arc; carène postérieure arquée et rejoignant l'antérieure au delà du milieu des côtés; carène antérieure à peine sinueuse; carène inférieure droite et se rapprochant insensiblement de l'antérieure qui la rejoint vers la base. Écusson caréné transversalement. Élytres finement granuleux et couverts de rugosités simulant des petites écailles régulières, déprimés de part et d'autre à la base, plans sur le disque, où se remarquent des poils courts, fins et très espacés, déclives sur les côtés, conjointement arrondis et dentelés au sommet. Dessous finement granuleux; pattes à peine ponctuées.

Agrilus japonicus nov. sp. — *Assez convexe, atténué à l'extrémité, d'un bronzé verdâtre, plus obscur en dessous qu'au dessus, le pronotum sillonné longitudinalement au milieu de la base.* — Long., 6; larg., 1,4 mill.

Japon (Staudinger).

Un peu plus grand et un peu moins acuminé au sommet que l'*Agr. tripartitus* H. Deyr., de Bornéo et de Perak, il ressemble à cette espèce quant au facies et ne se rapproche d'aucune autre du Japon.

Tête finement granuleuse, vaguement sillonnée dans toute sa longueur. Pronotum plus large que haut, aussi large en avant qu'en arrière, couvert de petites rides transversales; la marge antérieure

faiblement bisinuée; les côtés un peu rentrants en avant et en arrière et droits au milieu avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu; la base bisinuée avec le lobe médian légèrement échancré; carène postérieure courte, perpendiculaire à la base et n'atteignant ni celle-ci, ni la carène antérieure; celle-ci droite; carène inférieure un peu arquée et moins nette que la précédente. Écusson triangulaire. Élytres couverts de rugosités simulant des petites écailles régulières, déprimés de part et d'autre à la base, séparément arrondis et à peine dentelés au sommet. Dessous finement granuleux; pattes à peine ponctuées.

Agrilus sumbawanus nov. sp. — *Écourté, assez convexe, atténué en avant et subacuminé en arrière; tête et pronotum bleus, élytres verts; dessous bleu verdâtre; élytres échancrés à l'extrémité avec une petite dent suturale et une épine externe.* — Long., 6,5; larg., 2 mill.

Sumbawa (par Staudinger).

Un peu moins convexe et moins élargi au tiers supérieur que l'*Agr. acutus* Thunb., dont il se rapproche par le facies, mais l'épine élytrale externe moins prononcée, les élytres sans taches, ni bandes tomenteuses.

Tête ponctuée et couverte de rides longitudinales; front profondément sillonné. Pronotum à peine plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de rides sinueuses et transversales, déprimé de part et d'autre sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et faiblement arqué; les côtés un peu obliques, sinueux, rentrants vers la base avec l'angle postérieur obtus; la base bisinuée avec le lobe médian arqué; carène postérieure entière, arquée en arrière et redressée à partir du milieu où elle longe la carène antérieure; celle-ci sinueuse; carène inférieure moins nette que l'antérieure et parallèle à celle-ci. Écusson caréné transversalement. Élytres couverts de rugosités simulant des écailles, déprimés de part et d'autre à la base, échancrés de part et d'autre au sommet, l'échancrure un peu oblique et limitée de part et d'autre par une dent dont l'intérieure est moins saillante que l'extérieure. Dessous finement granuleux et ponctué, couvert de petites rides simulant des écailles; pattes ponctuées.

Agrilus nitidus nov. sp. — *Allongé, atténué à l'extrémité; tête bronzée; pronotum et élytres verts, ces derniers ornés de vagues bandes transversales grises. Dessous bronzé verdâtre.* — Long., 7,5; larg., 2 mill.

Australie : Cocktown (par Staudinger).

Tête régulièrement ponctuée; front inégal, légèrement bosselé en avant, sillonné en arrière. Pronotum presque aussi haut que large,

couvert de rides sinueuses et transversales, impressionné sur le disque, l'impression formant deux vagues fossettes superposées; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large, très avancé et arqué; les côtés un peu obliques; la base fortement bisinuée avec le lobe médian échancré; carène postérieure arquée et rejoignant l'antérieure vers le milieu des côtés; carène antérieure très sinueuse, arquée en avant et rejoignant l'inférieure vers le milieu; carène inférieure formant, dans sa moitié antérieure la corde d'un arc formé par l'antérieure. Écusson caréné transversalement. Élytres chagrinés, couverts de rugosités simulant des écailles, largement déprimés de part et d'autre à la base, laissant à découvert une faible portion latérale de la région supérieure du premier segment abdominal; le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous et pattes finement pointillés, plus lisses et plus brillants que le dessus.

Agrilus zonatus nov. sp. — *Étroit, allongé, peu convexe; tête et pronotum d'un bronzé cuivreux; élytres bronzés, obscurs, cuivreux à l'extrémité, ornés de part et d'autre d'une tache allongée médiane, villeuse et grise, contre la suture, et d'une tache villeuse, oblique et préapicale. Dessous très brillant, bronzé sur les côtés et vert au milieu.* — Long., 5,5; larg., 0,8 mill.

Australie (par Chevrolat).

Tête finement ponctuée et couverte de petites rides sinueuses et transversales; front sillonné, le sillon peu accentué et formant deux vagues fossettes superposées dont l'antérieure est beaucoup moins nette que la postérieure. Pronotum un peu plus haut que large, subrectangulaire, couvert de petites rides sinueuses et transversales; le milieu du disque à peine sillonné; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé, large et arrondi; les côtés légèrement arqués; la base bisinuée avec le lobe médian peu avancé et faiblement échancré en arc; carène postérieure faiblement arquée et ne rejoignant pas l'antérieure qui est subparallèle et assez rapprochée de l'inférieure qu'elle rejoint insensiblement vers la base. Écusson caréné transversalement. Élytres rugueux et couverts de rugosités simulant des petites écailles, largement déprimés de part et d'autre à la base, sillonnés de part et d'autre de la suture, le sillon large, limité extérieurement par une vague côte longitudinale et n'atteignant pas les dépressions basilaires; le sommet séparément arrondi et fortement dentelé. Dessous presque lisse, plus brillant que le dessus, très finement granuleux; pattes à peine ponctuées.

Aphanisticus taciturnus nov. sp. — *Allongé, élargi au tiers supérieur, entièrement noir et brillant.* — Long., 3,3; larg., 0,7 mill.

Ile Nias (Staudinger).

Appartient au groupe dont l'*Aph. mitratus* Chevr. est le type.

Tête profondément creusée avec le bord intérieur des yeux saillant et tranchant. Pronotum plus large que haut, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, le disque convexe et traversé par trois sillons transversaux et parallèles, le premier le long de la marge antérieure et légèrement cintré en arrière, le second médian et le troisième le long de la base; la marge antérieure sinueuse avec le lobe médian large, avancé et très arqué et les angles antérieurs saillants en avant et arrondis; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus et la marge latérale à peine crénelée; la base bisinuée avec le lobe médian étroit, avancé et subanguleux. Écusson très petit, en triangle allongé. Élytres convexes, déclives au tiers supérieur, avec de part et d'autre, sur le disque, une côte médiane élevée, une côte latérale longeant la marge postérieure et une côte discale longeant la suture sur la moitié antérieure jusque vers le milieu; les intervalles entre la suture et la côte médian inégaux et offrant des rides transversales interrompues par la petite côte discale; la marge latérale et la suture élevées; le sommet séparément arrondi. Dessous presque lisse.

Trachys chinensis nov. sp. — *Subovalaire, rugueux, assez convexe, entièrement noir, couvert de poils épars roux mêlés de quelques rares poils blancs.* — Long., 2,7; larg., 1,8 mill.

Hong-Kong (par Staudinger).

Assez voisin de *Tr. Davidis* Fairm., du Tonkin, mais un peu plus acuminé en arrière et l'allure du système pileux différente.

Tête villeuse, finement ponctuée, creusée en avant et sillonnée en arrière. Pronotum très finement pointillé, beaucoup plus large que haut; la marge antérieure bisinuée; les côtés très obliques et à peine arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian large, avancé et très arqué; la villosité est plus dense sur les côtés que sur le disque, qui est presque lisse. Élytres finement granuleux un peu plus rugueux sur les parties glabres que sur les parties villeuses; le calus huméral saillant et oblique; le sommet à peine dentelé et conjointement arrondi avec un très petit vide anguleux sutural. Dessous finement pointillé.

Trachys sumbawana nov. sp. — *Écourté, subglobulaire, convexe, le milieu des côtés parallèle, le sommet atténué et arrondi, entièrement noir et couvert de poils blancs disposés sans ordre, rares au milieu, plus denses sur les côtés; tête bronzée.* — Long., 2,5; larg., 1,6 mill.

Sumbawa (par Staudinger).

Se rapproche du *Tr. Davidis* Fairm., du Tonkin, mais un peu plus globulaire et moins acuminé au sommet.

Tête finement pointillée, déprimée en avant. Pronotum très fine-

ment pointillé, beaucoup plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés obliques et faiblement arqués; la base fortement bisinuée avec le lobe médian large, avancé et arqué. Écusson très petit, triangulaire. Élytres granuleux, convexes, rugueux sur les parties villeuses, irrégulièrement ponctués sur les parties glabres; le sommet conjointement arrondi et inerme. Dessous finement pointillé.

Trachys palawana nov. sp. — *Subpentagonal, peu convexe, entièrement noir; les élytres carénés le long de la marge latérale et couverts de poils blancs, courts, plus denses vers le sommet que vers la base et disposés en séries longitudinales dans le sens des stries ponctuées d'où ils émergent.* — Long., 2,2; larg., 1,2 mill.

Palawan (par Staudinger).

Voisin de *Tr. sparsa* Kerr., de l'Inde, quant au facies et à la taille, mais très différent quant à la coloration et aux détails.

Tête creusée, à peine ponctuée; le bord des yeux légèrement caréné. Pronotum beaucoup plus large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, sa ponctuation plus dense sur les côtés que sur le disque; la marge antérieure largement échancrée en arc; les côtés arqués en quart de cercle avec une large fossette dans l'angle antérieur; la base bisinuée avec le lobe médian large, avancé et arqué. Écusson très petit, triangulaire. Élytres rugueux, couverts de petites rides longitudinales peu accentuées et sensibles seulement sur les côtés; le calus huméral saillant et se prolongeant en côte peu sensible, longeant la marge latérale à une certaine distance de celle-ci; le sommet conjointement arrondi et à peine dentelé. Dessous lisse, brillant et à peine ponctué.